



Catálogo de variedades tradicionales de frutales ecológicos

Variedades para aficionados

2026



El vivero

Las variedades antiguas o tradicionales son el resultado del proceso de selección del agricultor que durante años ha seleccionado las variedades que mejor se adaptan a las características de su territorio. Esta selección permitió que durante épocas en que no existían medios de transporte ni de conservación, los agricultores pudieran proporcionar fruta a los mercados locales. Estas variedades a menudo se utilizaban para hacer conservas, sidra y muchas otras recetas locales que afortunadamente han permanecido en el tiempo. Las variedades antiguas son rústicas y resistentes a los agentes patógenos externos, por este motivo son ideales para el cultivo en agricultura ecológica. Desde nuestro vivero situado a los pies del macizo de las Gavarres, recuperamos variedades antiguas de frutales de toda Europa y de viveros de salvaguarda de nuestro territorio. Nuestra colección está formada por más de 170 variedades.

El vivero está formado por varias parcelas agrícolas en el Baix Empordà pero la actividad principal se desarrolla en la sede situada a los pies de las Gavarres en el municipio de Cruïlles. En el vivero nos dedicamos a la recuperación, conservación y reproducción de variedades tradicionales de frutales y frutos silvestres. Tenemos una colección de más de 170 variedades antiguas entre manzanos, perales, albaricoqueros, cerezos, melocotoneros, ciruelos, granados, higueras, La mayoría son variedades locales, que se cultivaban en diferentes lugares de Cataluña y otras se pueden encontrar en todo el continente europeo. Desde Arboreco también hacemos asesoramiento para plantaciones de frutales, tanto de particulares como de pequeños productores siguiendo los criterios de la agricultura ecológica.

Arboreco está inscrito al registro de operadores del Consejo Catalán de la Producción Ecológica (CT002151P) y al registro de proveedores de material vegetal con el número ES-09-17-0220.

Puntos de venta



En el vivero de Cruïlles (Baix Empordà, Gerona)

(Camí de la Palanca s/n)

Los árboles se pueden comprar directamente en el vivero, pero aconsejamos llamar (650742502) o enviar un correo electrónico antes (info@arboreco.net) para confirmar las existencias.



Envío por mensajero: También se pueden enviar los frutales por mensajero con gastos de puerto y embalaje a cargo del destinatario.



Ferias o mercados (Molins de Rei, Igualada, Salt, Roda de Ter, etc.): A menudo vamos a ferias o mercados donde podemos traerles las variedades que deseen, para saber dónde vamos pueden consultar la agenda de la web www.arboreco.net.

Precios orientativos

Plantones de 1 año de injerto, en contenedor de 3,5 lt. · 17,50 €

Plantones de 2 o más años de injerto, en contenedor de 5 i 10 lt. · 20,00 € – 30,00 €

Plantones de 1 año de injerto, a raíz desnuda · 16,00 € - 18,00 €



info@arboreco.net · tel. 650742502 · @arborecoviver - Cruïlles, Baix Empordà



ES-ECO-019-CT
Agricultura UE



PRODUCCIÓ
CONSELL DE LA
CCPAE

Pueden pedir un presupuesto a través de la web (comanda), por correo electrónico (info@arboreco.net) o llamando (650742502)

PORTAINJERTOS

Manzano

M 111 Portainjertos vigoroso, adecuado para suelos francos o poco fértiles, sensible a asfixia radical. Apropiado para baja densidad de plantación (300-500 plantas/ha). Marco de plantación aconsejado 5m x 5m.

M 7 Pie de vigor medio (15-30% respecto al franco), bastante resistente a la asfixia radical, actividad rebrotante media, adecuado para suelos calcáreos y secos. Marco de plantación aconsejado 5m x 5m.

M 9 Pie muy débil (hasta un 70-80% menos respecto al franco), necesita una estructura de soporte, idóneo para densidad de plantación elevada (1000-2000 plantas/ha). Entra en producción de forma rápida. Raíces muy superficiales, sensible a la sequía. Aconsejable para cultivo en pared.

PERAL

Franco Patrón obtenido desde semilla (*Pyrus comunis*), muy vigoroso, lento a la hora de entrar en producción, muy longevo (hasta 80/100 años). Se adapta a suelos encharcados, muy resistente a los hongos de las raíces (*Armillaria mellea*). Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Membrillo BA 29 Seleccionado desde Membrillo de Provenza (*Cydonia oblonga*), como es el más rústico de los membrillos, tiene más vigor y es más productivo, además entra en producción de forma bastante rápida y sus producciones son cualitativamente constantes. Adecuado para suelos fértiles y resistente a la sequía. Marco de plantación aconsejado 4m x 4m

Membrillo MA Seleccionado desde Membrillo de Anger. Vigor medio (20-30% menos que BA 29), rápido a la hora de entrar en producción y productivo. Sensible al frío y apto para suelos arcillosos. Marco de plantación aconsejado 4m x 4m.

ALBARICOQUERO

Franco Vigoroso, productivo, lento a la hora de entrar en producción. Para suelos poco fértiles, arenosos, no para terrenos encharcados ni compactados, resistente a la sequía y a los suelos calcáreos. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Mariana 2624 Mirabolán X *Prunus munsoniana*. Buena adaptabilidad a suelos calcáreos y compactos que acostumbran a encharcarse, medio vigoroso, resistente a la asfixia radical y a los nematodos. Marco de plantación aconsejado 5m x 5m

Montclar Selección de melocotonero franco, confiere gran vigor a la variedad, superior a GF 305, así como mayor resistencia a clorosis férrica y a la carencia de magnesio. Los árboles injertados son homogéneos en crecimiento y productivos. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

CEREZO

Franco (de semilla) Pie muy vigoroso, tardío a la hora de entrar en producción, adecuado para suelos francos, profundos y compactados. No tolera la sequía ni los terrenos desgastados. Buen anclaje, por lo tanto, es aconsejable para cultivos en pendiente. Marco de plantación 6m x 6m o más.

Santa Lucía (*Prunus mahaleb*) Más resistente que el cerezo franco a las temperaturas bajas, a la sequía y a los suelos calcáreos, muestra sensibilidad a la asfixia radical. Prefiere suelos ligeros, francos, pero se adapta a terrenos pedregosos y pobres. Vigor débil, muy buena afinidad con el cerezo ácido (guindo), aconsejable para cultivo en pared. Marco de plantación 5m x 5m o más.



MELOCOTONERO

Franco Pie de buen vigor. Adecuado para suelos fértiles, bien drenados. Induce una buena calidad de los frutos (calibre, contenido de azúcares, color, etc.), rápida entrada en producción. Elevada sensibilidad a la clorosis férrica y a la asfixia radical. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

Montclar Selección de melocotonero franco, confiere gran vigor a la variedad, superior a GF 305, así como mayor resistencia a clorosis férrica y a la carencia de magnesio. Los arboles injertados son homogéneos en crecimiento y productivos. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

GF 305 Clon de melocotonero franco, da árboles de buen vigor, adecuado para terrenos bien estructurados, poco sensible a suelos calcáreos. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

GF 677 Híbrido natural melocotonero X almendro, seleccionado en Francia. Vigoroso, a veces tarda a la hora de entrar en producción. Adecuado para suelos calcáreos, poco fértiles, sensible a los suelos encharcados y resistente a la clorosis férrica. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

CIRUELO

Franco (Mirabolano de semilla) Es el pie más usado, apto para cualquier tipo de suelo, da buen vigor a las plantas. Buena afinidad de injerto, no muy homogéneo. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Mariana GF 8/1 Patrón obtenido en EUA, hibridación libre entre Mirabolano Y *Prunus munsoniana*. Buena adaptabilidad a diferentes tipos de suelo, vigoroso, resistente a la asfixia radical. Buena productividad y calidad de los frutos. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

LISTADO DE VARIEDADES

MANZANOS	PERALES	ALBARICOQUEROS	D'EN ROCA
ANNURCA	BEURRE GIFFARD	ANTONIO ERRANI	DURONE DE CESENA
ASTRAKAN ROJO	BLANQUILLA	CANINO	DURONE DI VIGNOLA III
BELLA DE BOSKOOP	BONA LUIS D'AVANCHES	GALTA ROJA	MORA DE VIGNOLA
BELLES DE ROMA	CAMOSINA	MIRLO BLANCO	PICOTA - AMBRUNÉS
BLANCA DE ESPAÑA	CAMPANYA	MONIQUI	SANT PERE
CALVILLA BIANCA D'INVIERNO	CANYELLA	PAVIOT	SANT ISIDRE
CALVILLA AMARILLA	CASTELLS	PISANA	SELRANA
CALVILLA ROJA	CHATA	PORTICI	TIRITOS
CAMUESA	CO CER	PRECOCE D'IMOLA	HIGUERAS
CARABILLE	DECANA DE INVIERNO	ROUGE DE ROUSSILLON	BLANQUELLA
CARA SUCIA	DUQUESSA DE BERERD	TADEO	COLL DE DAMA BLANC
COMOSA	ERCOLINI		COLL DE MA NEGRE
CORAZÓN HELADO	FLOR DE INVIERNO	ALMENDROS	COLL DE DAMA RATLLADA
COLA LARGA	INVIERNO	FERRAGNES	GROGA
DECIO	LIMONERA	GARRIGUES	LUNGHET
DE RELLENO	MARTÍN SEC	GUARA	SAJOLA
DEL CIRI AMARILLO	MÓSCATELA	LLARGUETA	TRES FAN CARGA
DEL CIRI ROJO	PASSA CRASSANA	MARCONA	UVA
EUGENIA	MUSLO DE DAMA		12 campanadas
GRAVENSTEIN	PELL DE GALÁPET	CIRUELOS	Cardinal
LIMUNET	PERA DE PUIGCERDÀ	ANNA SPÀTH	Fresa
MAGNANA	PERETA BLANCA	BIRICOCCOLO	Moscatel
MANYAGA	PRIMERENCA DE TREVoux	COJÓN DE FRAILE	Picapoll
MORRO DE LIEBRE	ROCHA	COJÓN DE MONO - ROGETA DE AGOST	AVELLANOS
PALACIO DE OBISPO	SANTIAGO	DE AGEN	NEGRETA DE REUS
PERIQUET	SERMENYA	FRARE NEGRO	CASTANYERA
PIATLIN	TENDRAL DE REUS	LÁGRIMA DE ORO	CAQUIS
REINA DE REINETES	WILLIAM	LLEVADOR	TOMÀQUET
RENETTA ANANAS	MELOCOTONEROS	MADUIXADA	TIPUS
REINETTA BUMANN	AMSDEN	MIRABELLA DE NANCY	GRANADOS
REINETA CANADA	BELGA	MONSTRUOSA DE INGLATERRA	MOLLAR DE ELCHE
REINETTA DE INGLATERRA	BENVINGUT	QUETSCHÉ ALSACIA	GRANADO VINOSO
REINETA DAURADA	BLANC DE PARET DEL VALLÈS	REINA CLAUDIA DE ALTHAN	OTROS FRUTALES
REINETA GRISA DE SAINTOGNE	CANONGI DE CANONJA	REINA CLAUDIA DE OULLINS	Amelanchier canadensis
REINETA GRISA ANTIGUA	COTOGNO DI ROSANO	REINA CLAUDIA TOLOSA	Madroño
RENETTA DE LOS CARMELITAS	DIXIRED	REINETA - REINA CL. VERDA	Membrillo - "Pero cotogno"
REINETA CHAMPAÑA	ESCAROLITA	REINA CLAUDIA VIOLETA	Frambuesa
ROSA DE BERNA	GAVATX	RUSTICANO	Arandano
ROJO DE VALGREGHENTINO	MALLORQUÍN	SAN JUAN	Grosella roja
SANTIAGO	MELICOTÓ AMARILLO	SAN MIGUEL	Grosella negra
SAN JUAN	MELOCOTÓN DE CALANDA	SCAGNARDA	Ribes uva espina
SAN MIGUEL	MIRAFLORES	VALLESPÍR	Zarzamora sin espinas
AZÚCAR	MOLLAR ROJO	CEREZOS	Azufaifo
ULL DE NESPRE	MELOCOTÓN ROJO	AIGUARDENT	Morera alba (fruto blanco)
VERDE DONCELLA	POLLERO	BIGARREAU BURLAT	Morera alba (fruto negro)
	RESCLÓS	BIG. GEANT D'HEDELFINGEN	Nispero
	RONDAN	BIGARREAU MORREAU	Nogal
	ROQUETA	BIGARREAU TARDÀ VIGNOLA	Saúco
	ROQUETA HELADO	COR DE COLOM	Serbal
	SAN LORENZO	CUA LLARGA	Endrino
	SUDANELL	DE CABRIANES	
	VIÑA	DEL GRA	

MANZANOS

ÉPOCA DE FLORACIÓ

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
ANNURCA					
ASTRAKAN VERMELL					
BELFIORE			■		
BELLA DE BOSKOOP			■		
BELLESA DE ROMA			■		
CALVILLA BIANCA			■		
CALVILLA GIALLA			■		
CALVILLA ROSSA			■		
CAMOSA					
CAPÇADA					
CARA BRUTA					
CARABILLE					
COR GLAÇAT			■		
DE RELLENO			■		
DECIO					
DEL CIRI GROC			■	■	
DEL CIRI VERMELL			■	■	
EUGENIA			■		
GRAVENSTEIN					
LIMUNET					
MANYAGA			■		
MORRO DE LLEBRE					
PALAU DE BISBE			■		
PERIQUET			■		
PIATLIN			■		
PIC DE PEDRÍS			■		
REINA DE REINETES			■		
REINETA DAURADA			■		
REINETA DE CANADA			■		
REINETA DEL			■		
REINETA XAMPANYA			■		
REINETTA BUMANN					
REINETTA D'ANGLATERRA					
RENÈ CRIVEN			■		
RENETA ANANAS			■		
RENETTA DEI CARMELITANI					
ROSA DE BERNA					
ROSSO DI VALGREGHENTINO			■		
RUNÈ			■		
SANT JAUME					
SANT JOAN				■	
STAYMARED			■		
SUCRE			■		
ULL DE NESPRE					
VERD DONZELLA					

ÉPOCA DE MADURACIÓN

VARIEDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANNURCA								
ASTRAKAN ROJO								
BELLA DE BOSKOOP								
BELLESA DE ROMA								
BLANCA DE ESPAÑA								
CALVILLA BIANCA								
CALVILLA GIALLA								
CALVILLA ROSSA								
CAMUESA								
CARABILLE								
CARA SUCIA								
COLA LARGA								
COMOSA								
CORAZÓN HELADO								
DECIO								
DEL CIRI AMARILLO								
DEL CIRI ROJO								
DE RELLENO								
EUGENIA								
GOMOSA								
GRAVENSTEIN								
LIMUNET								
MAGNANA								
MANYAGA								
MORRO DE LIEBRE								
PALACIO DE OBISPO								
PERIQUET								
PIATLIN								
REINA DE REINETES								
REINETTA BUMANN								
REINETTA DE INGLATERRA								
REINETA DE CANADA								
REINETA DAURADA								
REINETA GRISA DE SAINTOGNE								
REINETA GRISA ANTIGUA								
REINETA CHAMPAÑA								
RENETTA ANANAS								
RENETTA DE LOS CARMELITAS								
ROJO DE VALGREGHENTINO								
ROSA DE BERNA								
SANTIAGO								
SAN JUAN								
SAN MIGUEL								
AZÚCAR								
ULL DE NESPRE								
VERDE DONCELLA								

ANNURCA

descripción

Era conocida por los romanos con el nombre de "Orcola", tal y como recuerda G.B.Porta en 1583, descrita por Plinio y representada en los frescos de Ercolano (Napoli, Italia). Es muy rústica y productiva, adaptada a las **zonas templadas** y **resistente a todo tipo de transformación**.

fruto

Fruto pequeño o mediano, de forma constante, esférica-achatada, piel lisa, espesa, casi completamente roja, con pequeñas manchas y rugosa en la zona del pedúnculo. La pulpa es blanquecina, dura, no mucho jugosa, más bien dulce, acidula. Se recoge en **octubre**.

consejo

Ya que está sometida a la caída precoz, se recoge verde y se **deja enrojecer durante dos meses** en las típicas "Melare" (pequeños porches).



ASTRAKAN ROJO

descripción

Probablemente originaria de la Rusia septentrional y más tarde difundida en los Países nórdicos (Suecia, Noruega) por su precocidad. Árbol poco vigoroso de porte erguido, **aguanta** el frío intenso, resistente al moteado.

fruto

No se conserva por mucho tiempo. Fruto de tamaño mediano, de forma redonda achatada, piel roja con rayas más oscuras. La pulpa es blanca, fina, tierna, poco jugosa, azucarada, perfumada, sabor de buena calidad. Época de cosecha julio, agosto.

consejo

No se conserva por mucho tiempo.

sinónimos

Astracan Rosso, Astracan Rouge, Astracan Rojo, Roter Astrakan, Roter Ernteapfel, Roter Augustapfel, Roter Jakobsapfel, Roter Sommerapfel.



AZÚCAR

descripción

Árbol de vigor medio con ramas erguidas.

fruto

La forma del fruto es achatada normal y oblicua, de tamaño mediano, la piel es fina, brillante y muy aromática. Coloración matizada amarilla-verdosa estriada de rojo con herrumbre en la cubeta basilar. El sabor es ácido, aromático, tierna y poco jugosa. Madura a finales de octubre, principios de noviembre y se conserva hasta marzo.



BELLA DE BOSKOOP

descripción

Variedad tradicional de origen holandés, se cree que deriva de una semilla encontrada en Boskoop el 1856 por K.J.W.Ottolander (Holanda). El árbol es muy vigoroso y productivo, poco sensible al moteado.

fruto

Fruto de tamaño mediano a mediano-grande, de forma variable, redondeado, asimétrico. Piel rugosa, con presencia de herrumbre, a veces manchada de forma irregular con estrías rojizas o anaranjadas. La pulpa es blanca-cremosa, crujiente, compacta, medianamente jugosa, azucarada, ligeramente acidula, poco aromática pero excelente. Época de maduración a partir de la **segunda mitad de octubre**.



BELLESA DE ROMA

descripción

Árbol poco vigoroso de porte semi-erguido con ramas delgadas y flexibles. Madera oscura, rojiza con lenticelas. Por su escaso vigor se presta bien a la formación en espaldera muy productiva y regular. Es sensible al oídio.

fruto

Fruto de tamaño de mediano a grande, tronco de forma cónica, oblonga, de contorno esférico regular. Piel brillante, untosa, aromática, gran parte de la superficie puede estar cubierta de una capa de color rojo intenso o rayada, con punteado blanquecino, regular, abundante. Pulpa blanca crema, harinosa, crujiente, sabor ligeramente ácido, aromática. Maduración tardía hacia octubre – noviembre.

consejo

Se conserva bien en la cámara frigorífica.

sinónimos

Rome Beauty (EUA)



BLANCA DE ESPAÑA

descripción

Variedad originaria de *l'Aude* (Francia).

fruto

Piel de color amarillo con pulpa firme y jugosa de sabor muy dulce y particularmente azucarada. Maduración tardía hacia **noviembre-diciembre**.

Imagen no disponible

CALVILLA BIANCA DE INVIERNO

descripción

Varietal muy antigua de origen incierto, tuvo un gran renombre en el pasado. Parece ser que su procedencia es de Wurtemberg (Alemania), donde se conocía antes del 1598, de allí se expandió hasta Suiza y más tarde llegó a Francia con el nombre de Calvilla, debido al topónimo de la localidad francesa de Calville (Eure). El árbol es vigoroso y de porte expansivo, sensible al frío.

fruto

El fruto es grande de forma constante, un poco achatado con surcos y abultamientos evidentes en la parte inferior (característica típica de la calvilla). La piel es de color verde amarillento, a veces con un difuminado rojo-anaranjado. La pulpa es de color blanco crema, delicada, jugosa, fina, compacta, acidula, aromática, muy buena. Madura desde **medianos de noviembre hasta principios de diciembre**.



CALVILLA AMARILLA

descripción

También se conoce con el nombre de *Modenese*, esta variedad tradicional parece ser originaria de Modena, de hecho el pomólogo Galesio la recuerda en 1815 con el nombre de "manzana de Módena". El árbol es rústico, con un vigor medio escaso, de porte más bien expansivo, con discreta resistencia al oídio y al moteado, tiende a la alternancia.

fruto

El fruto es pequeño (pesa unos 105 gramos) y presenta una forma esférica. La piel es roja sobre un fondo amarillo-verdoso o blanco-crema, ligeramente acidula. Se recoge a finales de octubre y se conserva fácilmente hasta diciembre.

consejo

Fructifica sobre todo en las ramas pequeñas que terminan con un botón mixto que se debe respetar cuando se poda. Discreta para el consumo fresco es ideal para cocer. Para su polinización se recomienda la variedad *Abbondanza*.



CALVILLA ROSSA

descripción

Se cree que es originaria de Bélgica (principios del 1800), pero Lelectier (procurador del rey en Orleans) la cita en 1628 como la *Calvilla del Rey*. El árbol es fértil, poco vigoroso y poco susceptible al moteado.

fruto

Fruto de tamaño mediano-grande, tronco cónico, oblongo, una poco irregular y a veces asimétrico. Piel verde casi totalmente recubierta de un rojo intenso, lisa, delgada, cerosa, con pequeñas manchas blancas. La pulpa es blanca-cremosa y rosada en la zona central, de textura fina, medianamente jugosa, crujiente, dulce, ligeramente acidula y aromática. Madura a partir de la **segunda mitad de octubre**.

consejo

Buena variedad para los cultivos de montaña.



CAMUESA

descripción

Árbol vigoroso escaso de porte de baja altura. Tendencia a agotarse por falta de renovación de maderas, es necesario tenerlo en cuenta en época de poda. El manzano Mañaga resulta ser una buena polinizadora.

fruto

Fruto de calibre mediano a grande, de forma tronco cónica con tendencia esférica, achatada. Piel mate, si se frota brilla, aromática, de coloración matizada amarilla, , parcialmente teñida de rojo con punteado claro, uniforme. Pulpa ligeramente crujiente, firme, harinosa, dulce y aromática. Madura de **finales de septiembre a principios de octubre**.



CARABILLE

descripción

Variedad muy válida, originaria de l'*Aude* (Francia).

fruto

Fruto de calibre de pequeño a medio, aplanado, piel de color rojo oscuro, muy perfumada. La pulpa es dulce, crujiente de color blanco marfil. Maduración hacia noviembre y se conserva bien hasta abril.



CARA SUCIA

descripción

Parecida a Manzana o Reineta Terrera. Árbol de vigor mediano de porte semi-erguido. Se cita en la bibliografía dos variedades: Cara Bruta Dolça con pulpa ligeramente acídula y Cara Bruta Agre con pulpa ácida.

fruto

Fruto de calibre pequeño, achatado, de contorno esférico irregular. El pedúnculo es corto, leñoso con inserción recta. Piel con fondo de color amarillo verdoso, cubierta casi totalmente de ferruginosidad pseudoverdosa, con escaso punteado, claro con aureola. Pulpa de color blanco crema con reflejos verdosos, crujiente, un poco harinosa, de sabor muy dulce. Maduración de los últimos diez días de septiembre hasta los primeros de octubre.



CORAZÓN HELADO

descripción

Árbol de porte abierto y de vigor mediano.

fruto

El fruto es redondo de buenas dimensiones y de coloración amarillenta con poca herrumbre. Durante la maduración el centro adquiere una textura gelatinosa, firme y ligeramente dulce y de buen sabor. Madura en **octubre**.



COLA LARGA

descripció n

Árbol con vigor considerable, alto y con el porte bastante abierto.

fruto

Fruto de forma aplastada y oblicua de tamaño mediano. Piel de color verde-amarilla y donde le da el sol un poco rojiza. Pulpa de color blanco, ferma dulce-acídula. Se recoge el mes de octubre i se conserva hasta marzo.



COLA LARGA ROJA

descripció n

Fruto de calibre mediano con forma redonda cónica.

fruto

La piel es seca, fina, brillante y aromática de color rojo intenso. La pulpa es de sabor ácido, de consistencia firme, crujiente, de coloración blanca. Madura hacia el mes de octubre y se conserva hasta marzo, principios de abril.



COMOSA

descripció n

Varietad recuperada en Hostalets de Pierola (Anoia, Cataluña).

fruto

Con muy buenas cualidades organolépticas, maduración al mes de noviembre y se conserva todo el invierno.



DECIO

descripció n

Árbol rústico, muy vigoroso, poco sensible al moteado.

fruto

Fruto de calibre mediano – pequeño, forma tronco-cónica, ligeramente aplanada, piel lisa, pruinosa, de color mate con manchas de color rojo-vino donde le toca el sol. La pulpa es de color blanco-cremosa, soda, azucarada y aromática. Ideal para cocer al horno o para hacer pasteles. Se recoge hacia mediados de octubre.



DEL CIRI AMARILLO

descripció n

Árbol de vigor entre escaso y mediano de porte de poca altura con las ramas erguidas, muy productivo.

fruto

Fruto de forma oblonga-cónica, de calibre entre mediano y grande, piel de coloración amarilla clara con toques rojizos aunque puede presentar diferentes coloraciones, fina, delgada, brillante, untuosa y aromática. La pulpa es de color blanco crema, poco jugosa, dulce y tierna. Se recogen hacia octubre o noviembre.

consejo

Cuando se recogen se cubren con hojas de helecho o de maíz, y se dejan así un par de meses sin tocarlas hasta prácticamente Navidad, de esta forma adquieren esta coloración amarilla tan peculiar. Se conservan hasta marzo, inicio de abril.



DEL CIRI ROJO

descripción

Árbol de vigor medio de porte abierto.

fruto

Fruto de calibre mediano a pequeño, alargado, de contorno irregular, pedúnculo de corto a mediano, leñoso, inclinado hacia un lado y muy hundido. Piel de color rojo claro con chapa uniforme (en más del 50%), punteado blanco. Pulpa de color crema fibrada de verdoso a rosado. Su sabor mejora en la madurez fisiológica. Se recoge en el mes de octubre.



DE RELLENO

descripción

Varietal local del Ampurdán, árbol de poco vigor, piel de color verde cremosa.

fruto

Madura hacia finales de septiembre a Serra de Darò (Baix Empordà). Pulpa dulce, jugosa, crujiente, firme incluso cuando se cuece, de hecho es la típica variedad para cocer con "relleno".



EUGENIA

descripción

Árbol de vigor mediano, de porte abierto, tendencia a alargarse las ramas en posición horizontal.

fruto

Fruto de forma redonda, de coloración matizada amarilla clara, marmolado de rojo, piel fina y brillante sin herrumbre. La pulpa es firme, muy aromática y ligeramente ácida. Madura en octubre.

sinónimos

Santa Eugenia, Vigatana



GRAVENSTEIN

descripción

Antigua cultivar veraniega. Árbol medianamente resistente al moteado y al oídio, muy resistente al frío.

fruto

Fruto de tamaño mediano a grande y de forma cónica. Piel lisa, untosa, fina, amarilla con numeroso punteado gris, con estrías rojas cuando empieza a estar madura. La pulpa es blanca- marfil, fina, crujiente, poco azucarada, ligeramente acidula, aromática y perfumada. Madura en agosto.



LIMUNET

descripción

Varietal tradicional probablemente originaria de Alemania (encontrada antes del 1850).

fruto

Fruto aplastado. Piel lisa, delgada pero dura. Pulpa blanca, acidula, ligeramente dulce, crujiente y muy jugosa. Óptima para cocer al horno. Madura la segunda mitad de octubre.



MAGNANA

descripción

Variedad cultivada en Piemonte (Italia) desde finales del siglo XIX, su nombre proviene de la localidad donde fue encontrada. El árbol es rústico, vigoroso, fértil, alternante, sensible al pulgón, tolerante al moteado y resistente al oídio.

fruto

Fruto de calibre mediano, cónico-alargado, irregular; piel verde amarillenta con difuminados rojos o granates, con punteado evidente. La pulpa es de color blanco-verdoso, crujiente, de textura fina, se deshace, jugosa, de gusto dulce ácido, con cierto sabor anisado. Se recoge a finales de octubre y madura en noviembre, se conserva hasta marzo-abril.



MAÑAGA

descripción

Árbol con vegetación erecta y vigorosa.

fruto

Fruto de calibre de mediano a grande con forma cónica alargada, con la anchura máxima hacia el pedúnculo. De contorno irregular en la mayoría de los frutos, acaba en forma de morro en la zona pistilar. Piel lisa, luciente, fuerte y de charol, color amarillo verdoso uniforme con una ligera chapa en la zona de insolación. Pulpa blanca con tendencia a verdosa. Pulpa crujiente, muy jugosa, dulce y con un poco de sabor anisado.

Maduración comercial: últimos diez de Octubre – primeros diez días de Noviembre.



MORRO DE LIEBRE

fruto

Sabrosa, dulce, crujiente y muy perfumada. Floración tardía y maduración hacia noviembre.

consejo

Muy buena cocida.



PALACIO DE OBISPO

descripción

Árbol de vigor mediano de porte irregular.

fruto

El fruto es de tamaño mediano de coloración roja y la pulpa es dulce. Se recoge en octubre y no se conserva.



PERIQUET

descripción

Antigua variedad. Árbol de vigor mediano a muy vigoroso.

fruto



Fruto de forma redondeada, de calibre mediano, piel amarilla con un 30% de la superficie rosada y pulpa dulce. Maduración en el mes de septiembre.

PIATLIN

descripción

Manzana otoño-invernal originaria de Biellese (Val Elvo) conocida también con el nombre de *Piatarlini*. Árbol rústico con estructura en altura, muy fértil. Resistente al moteado y al oídio.

fruto

Fruto mediano, muy achatado. La piel es verdosa-bronce, herrumbrosa, áspera y delgada. La pulpa es blanca, crujiente, jugosa, dulce, ligeramente acidula y perfumada, con un particular regusto a avellana y almendra. Se recoge la tercera semana de septiembre.

consejo

Se conserva hasta febrero o marzo.



REINA DE REINETAS

descripción

Varietal antigua de origen centroeuropeo.

fruto

Árbol vigoroso. Fruto de calibre mediano (110 g), redondo cónico, piel densa, lisa, de color amarillo-dorado, con rayas rojizas y punteado gris oscuras en la parte soleada. Pulpa blanca – amarillenta, crujiente, firme, fina, jugosa, azucarada, ligeramente acidula y muy perfumada. Maduración a partir de finales de agosto hasta octubre, dependiendo del lugar de plantación.

sinónimos

Queen of the pippin, Reine des reinettes, Reinette de la couronne, Reinette rousse, Röthliche Renette, Renetta Rossigna altres de *Parmena Dorata d'Inverno, Pearmain Doré, Golden Winter Pearmain*



REINETA BAUMANN

descripción

Originaria de Bélgica, probablemente obtenida hacia el 1800, por el pomólogo belga Jean-Baptiste Van Mons. Fue descrita por primera vez en el año 1811. Conocida también en toda Europa, fue dedicada a los viveristas y hermanos Baumann de Bollwiller (Francia), los cuales contribuyeron a su difusión. Árbol fértil y productivo, apto para el cultivo de montaña.

fruto

Fruto de calibre grande, redondo, achatado, piel con fondo de color amarillo, recubierta casi totalmente por franjas rojas oscuras. La pulpa es amarillenta, firme, semifina, dulce-acidula, ligeramente perfumada de buena calidad. Normalmente se recoge a finales de octubre y madura hacia diciembre.



REINETA DE INGLATERRA

descripción

Árbol vigoroso.

fruto

Fruto de tamaño grande, con la típica forma de las reinetas. Pulpa tierna, azucarada, de agradable acidez y perfume delicado. Maduración hacia octubre.

consejo

Excelente también para hacer mermelada.



REINETA DE CANADÁ

descripción

Variedad muy antigua de origen francés, citada en 1771 por el francés *Andrieaux*. Árbol vigoroso de porte expansivo, lento a la hora de fructificar, medianamente resistente al moteado.

fruto

Fruto grande, achatado, abultado, irregular, con punteado considerable. La piel es amarilla con difuminado rojo-bronce donde le da el sol, con herrumbre más o menos extenso en el peciolo. La pulpa es de color amarillento, bastante jugosa, fina azucarada, acídula, aromática y de óptimas cualidades gustativas. Madura a principios de septiembre hasta octubre.

consejo

Se conserva durante poco tiempo.

sinónimos

Renetta del Canadà, Reinete de Canada, Canada Pippin, Tortezzo, Weisserrenette.



REINETA DORADA

descripción

Variedad originaria de los Pirineos Orientales.

fruto

Fruto de tamaño mediano-pequeño (115 gr.) con forma aplanada, bastante irregular, asimétrica con la piel de color amarillo – verde, lisa, cerosa, con un punteado pequeño de color oxidado. Herrumbre en la cavidad del peciolo que forma una mancha continua más o menos extensa. Pulpa de color blanco-amarillo, tierna, un poco harinosa, dulce-acídula, jugosa y con excelentes cualidades gustativas. Madura la segunda mitad de septiembre.



REINETA GRISA DE SAINTOGNE

descripción

Origen antiguo y desconocido.

fruto

Fruto de calibre medio a grande y de forma variable, a veces es alargado y cónico, otras, corto y aplastado. Piel fina y áspera completamente de color bronce pasando de color gris-verde a roja brillante. Pulpa rojiza, firme, de sabor dulce, acídulo, ligeramente anisada. Buena para hacer pasteles. Se recoge hacia el mes de octubre.



REINETA GRISA ANTIGUA

descripción

Árbol de porte muy abierto y vigoroso.

fruto

El fruto de calibre mediano, redondo achatado es de coloración amarilla-marrón, cuando está madura puede presentar un difuminado rojo en la parte expuesta al sol, piel seca, áspera y lisa. La pulpa es amarillenta, crujiente, firme, dulce, de buen sabor y muy aromática. Se recoge en octubre.



REINETA DE LOS CARMELITAS

descripción

De origen francés, citada por *Morlet* en 1667. Variedad tradicional bastante difundida por Francia y Alemania en el 1800. A menudo se confunde con la *Renetta de Kassel pequeña*, y también con la *Reinette Rousse o des Carmes*. Árbol poco vigoroso, fértil, bueno para el cultivo en altitud.

fruto

Fruto de tamaño mediano, redondeado-alargado, casi siempre con una hinchazón lateral en el peciolo que la hace caracteriza. La piel es de color amarillo con estrías rojas en el lado expuesto al sol, con punteado rojizo oscuro bastante evidente. La pulpa es sabrosa, blanca, fina, bastante azucarada. Se recoge hacia octubre-noviembre y se puede conservar hasta febrero/marzo.

consejo

Es una buena variedad para comer fresca y para elaborar sidra, también se puede cocer.

sinónimos

Reinette des Carmes, Limonen Reinette, Reneta dei Carmelitani, Karmeliter-Reinette.



ROSA DE BERNA

descripción

Variedad apta para el cultivo de montaña, rústica y resistente a las enfermedades.

fruto

Pulpa fina, jugosa, acídula y refrescante. Maduración en septiembre y se conserva hasta noviembre.



ROSSO DE VALGREGHENTINO

descripción

Variedad de origen italiana de un pueblo al lado del Lago de Como. Árbol muy rústico, de medio vigor y tolerante al moteado.

fruto

Fruto de tamaño entre mediano y pequeño, piel de color rojo sobre fondo amarillo. La pulpa es blanca, muy crujiente y dulce. Se recoge a partir de finales de agosto hasta el mes de septiembre.



SANTIAGO

descripción

Árbol de vigor mediano de copa redondeada.

fruto

Fruto de calibre mediano, forma redonda cónica, piel delgada, untosa, fina, brillante y aromática de coloración matizada amarilla-verdosa estriada de rojo, con herrumbre marrón claro localizado en la cubeta basilar y con punteado regularmente repartido. La pulpa es amarillenta, firme, crujiente, aromática y de sabor subácido. Pedúnculo mediano, leñoso y erguido. Se recoge a finales de julio, principios de agosto.



SAN JUAN

descripción

Árbol de poco vigor.

fruto

La forma del fruto es redondeada achatada. Piel de superficie lisa, de coloración roja intensa. Pulpa crujiente, jugosa y dulce. Se puede volver harinosa. Se recoge en **julio**.



SAN MIGUEL

fruto

Fruto de calibre muy grande (370 g), piel verde, un poco pegajosa con la pulpa blanca marfil, crujiente, medianamente jugosa y dulce. Se guarda hasta enero/febrero. Se recoge a finales de septiembre.



ULL DE NESPRE

descripción

Árbol de vigor medio con ramas muy erguidas con copa de forma cónica.

fruto

Piel lisa, untuosa y aromática, de coloración amarillo-verdosa con tonalidades rojizas en la parte expuesta al sol. Forma del fruto redonda achatada con un rosetón muy abierto. Pulpa de sabor ácido, de consistencia firme y crujiente. Se recoge a finales de septiembre, principios de octubre.



VERDE DONCELLA

descripción

Variedad conocida en España desde hace muchos años, era la variedad más difundida de Aragón y desde hace unos 50 años también se encuentra en Lérida. Crecimiento vertical los primeros años, de porte semi-erguido, parece autofértil.

fruto

Fruto de calibre mediano y forma generalmente más ancha que alta, de contorno irregular, oblongo o elíptico, casi siempre rebajado de un lado. Piel lisa, ligeramente untuosa, de color amarillo o blanco cera con difuminados rosados en la zona soleada, con punteado ferruginoso o blanco. Pedúnculo fino, leñoso, la pulpa es blanca verdosa, jugosa, dulce y perfumada, de cualidades gustativas excelentes. Maduración en octubre,

consejo

A veces se usa para cocer. De buena conservación en cámara frigorífica.



PERALES

ÉPOCA DE FLORACIÓ

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
BEURRE GIFFARD					
BONA LUISA D'AVRANCHES					
BLANQUILLA					
CAMOSINA					
CAMPMANYA					
CANYELLA					
CASTELLS					
COURE					
CUIXA DE DAMA					
CURATO					
DECANA D'HIVERN					
ERCOLINI					
FLOR D'HIVERN					
HIVERN					
LLIMONERA					
MARTIN SEC					
MOSCATELLA					
PASSA CRASSANA					
PERETA BLANCA					
PELL DE GALÀPET					
PERA DE PUIGCERDÀ					
PRIMARENCA DE TREVoux					
ROCHA					
SARMENYA					
SANT JAUME					
TENDRAL DE REUS					
XATA					
WILLIAM					

ÉPOCA DE MADURACIÓN

VARIEDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BLANQUILLA								
CAMOSINA								
CAMPANYA								
CANYELLA								
CASTELLS								
CHATA								
COCER								
DECANA DE INVIERNO								
DUCHESSA D'ANGOULÊME								
DUQUESA DE BERERD								
ERCOLINI								
FLOR DE INVIERNO								
INVIERNO								
LIMONERA								
MARTÍN SEC								
MÓSCATELA								
MUSLO DE DAMA								
PASSA CRASSANA								
PELL DE GALÀPET								
PERA DE PUIGCERDÀ								
PERETA BLANCA								
PRIMERENCA DE TREVoux								
ROCHA								
SANTIAGO								
SERMENYA								
TENDRAL DE REUS								
WILLIAM								

BEURRE GIFFARD

descripción

Siembra al azar descubierta en Angers por M. Giffard 1825. Árbol de medio vigor con puerto anárquico y buena productividad.

fruto

Pera de mesa con carne blanca, fina, moderadamente jugosa, dulce, muy perfumada. La piel es fina, verdosa que se vuelve amarilla en maduración y a menudo se vuelve roja en la cara expuesta al sol. Cosecha **entre mitad y finales de julio**



BLANQUILLA

descripción

Variedad muy difusa y comercializada debido a su buena conservación, árbol muy vigoroso.

fruto

Pera de agua, fruto de tamaño mediano, de forma alargada, oblonga y periforme. Piel de color verde claro y pulpa jugosa, blanca, dulce y muy aromática. Recolección de finales de julio a principios de agosto.

sinónimos

Peral de agua de Aranjuez



BUENA LUISA DE AVRANCHES

descripción

Variedad originaria de Normandía obtenida por el Sr. Longueval de Avranchesn (Francia) en 1780. Árbol vigoroso, resistente al frío, de floración tardía y abundante, adecuado para cultivo de montaña.

fruto

Fruto de tamaño mediano, ligeramente perfumado, piel de color amarillo-verdosa. La pulpa es dulce, blanca, fundente, jugosa y soda. Maduración a **medianos de setiembre**.



CAMOSINA

descripción

Árbol de vigor medio de porte bastante abierto y muy productivo. Floración a mediados de abril.

fruto

Fruto de calibre pequeño, parecido a Castells, pero una poco más alargado. De forma sub-oval piriforme a veces ligeramente asimétrica. Pulpa blanca o blanca amarillenta, pedúnculo mediano, rígido con inserción oblicua. La piel es lisa, mate, fina y aromática de color amarillo verdoso o dorado, punteado abundante. Peso medio de unos 38 gramos. La pulpa es muy dulce, firme, crujiente y aromática (sabor a moscatel), agradable. Se puede poner modorra. Recolección de finales de junio a principios de julio.



CAMPMANYA

descripción

Árbol muy vigoroso, de porte erguido con poca intensidad de ramificación.

fruto

Fruto con la forma típica de la pera, simétrica y redondeada con las cavidades basilar y apical superficiales. Pedúnculo largo y fino, de implantación oblicua como prolongación del fruto. Piel lisas y suave, brillante, de color amarillo verdoso o dorado, con punteado repartido de forma irregular. Pulpa blanca o ligeramente verdosa, un poco crujiente, azucarada, firme, ligeramente granulosa y jugosa. El sabor es agradable con ligero sabor a limón. Se recoge durante la primera mitad de julio.



CAÑELLA

descripción

Variedad encontrada por *Giffard en Fusièrre* (Francia) en el año 1825. Árbol poco vigoroso, productivo aunque a veces alternante, apta para el cultivo en eje. Sensible al moteado y psiles, bastante resistente a carpocapsa.

fruto

Fruto de tamaño mediano, forma típica de pera, redondeada irregularmente, pedúnculo de longitud mediana. La piel es de color verde paja con manchas rojizas en el lado soleado. Pulpa sabrosa, de buena calidad gustativa. El centro del fruto puede volverse modorro, así que debe consumirse pronto aunque en cámara la conservación es superior a las variedades Castells i Moscatella. Se recoge los últimos días de junio hasta los primeros diez días de julio.

sinónimos

Mantecosa Giffard, Cañella.



CASTELLS – PERA DE SAN JUAN

descripción

El primer lugar donde apareció fue en Can Castells de Sant Boi de Llobregat, procedente de Sur América, el 1850. Es también conocida en la zona como Pera de San Juan. Árbol muy vigoroso, porte erecto y con pocas ramificaciones. Fructifica básicamente en lamburdas que se tienen que respetar durante la poda. Es muy productiva cuando se consigue equilibrarla.

fruto

Fruto de tamaño pequeño bastante aplastado, pedúnculo fino y carnoso en la base. Piel verdosa, verde-amarilla y amarillo limón cuando es madura. Presenta una mancha roja rosada en la cara donde le toca el sol. Carne blanca, firme y azucarada de un sabor característico que hace que se la considere una pera veraniega de calidad. Se recoge los últimos diez días de junio.

consejo

Variedad autoestéril, favorece la polinización de Ercolini, Blanquilla, Moscatella, Cañella y Campmanya.



CHATA

fruto

Fruto de forma aplanada con piel de coloración amarillenta, pulpa fina.

Imagen no disponible

Maduración hacia septiembre (Garrotxa). En proceso de caracterización.

COCER

descripción

Árbol muy vigoroso con porte de forma piramidal.

fruto

Fruto grande de coloración verde moteada de marrón. La pulpa es de sabor áspero pero aromático. Madura en octubre.

consejo

Variedad de pera para cocinar.



DECANA DE INVIERNO

descripción

Se cree que el pomólogo belga *Van Mons* la encontró a principios del 1800 en el jardín de los Capuchinos de la Universidad de Lovanio (Bélgica). Planta de vigor mediano, muy fértil, sensible a las heladas tardías, prefiere ambientes templados.

fruto

De calibre grande, globosa-ovoide, piel lisa verde-amarilla, con muchas manchas y oxidada en la cavidad inferior. La pulpa es blanquecina, compacta, azucarada, ligeramente ácida y perfumada, sabor óptimo. Madura en invierno, a partir de diciembre.

consejo

Óptima para conservarse.



DUQUESA D'ANGOULÊME

descripción

Árbol medianamente vigoroso y muy fértil. Se encontró dentro de la propiedad de los *Eparonnais* en el municipio de *Querrè* (Francia). El 1820 se dedicó a la *Maria Teresa Carlotta* de Francia duquesa de *Angoulême*.

fruto

Fruto bastante grande con la piel gruesa, verde clara, que se vuelve amarilla cuando madura y con manchas rojas-oxidadas. La pulpa es blanca-verdosa, se deshace, jugosa, a veces con textura granular, poco dulce, gustosa y ligeramente perfumada. Madura en octubre.




DUQUESA DE BERERD

descripción

Árbol de buen vigor.

fruto

Fruto de calibre grande, de forma más larga que alta, achatada en la parte del pedúnculo. Piel bronceada, oxidada en la insolación. La pulpa es blanca, crujiente, azucarada, jugosa, perfumada y de sabor excelente. Maduración hacia noviembre-diciembre.



ERCOLINI

descripción

Variedad toscana (Italia), árbol vigoroso y productivo, muy fértil sobre todo si es injertado sobre membrillero, floración medio-precoc y se puede adaptar bien a zonas cálidas. Actualmente variedad con un gran potencial comercial.

fruto

Fruto medio, alargado, cónico, piel fina, lisa, de color verde claro-amarillenta que tiende a amarillo intenso hacia la maduración con mancha rojiza en el lado soleado. Pulpa blanco-crema, fondant, jugosa, azucarada, sabor delicioso y ligeramente perfumada. Fruto resistente a las manipulaciones post-cosecha. Maduración entre finales de julio y principios de agosto.

sinónimos

Coscia, San Cristoforo, San Domenico.



FLOR DE INVIERNO

descripción

Árbol poco vigoroso de porte semi-erguido pero abierto cuando carga. Buena intensidad de ramificación, de rápida entrada en producción y no es alternante.

fruto

Fruto de tamaño muy grande de forma achatada e irregular. Piel gruesa, verde amarillenta con mancha rojiza-marrón bastante extensa en la parte soleada. Pulpa blanca, dulce, jugosa, crujiente y de sabor agradable. Recolección a finales de septiembre – primera mitad de octubre. Buena conservación incluso fuera de cámara.



INVIERNO

descripción


Árbol vigoroso de copa en forma de pirámide, ramas largas que forman poco ángulo con el tronco.

fruto

Fruto de forma sub-oval piriforme con corona obtusa, de calibre muy grande. La piel es gruesa, seca, poco aromática, de coloración amarilla con pecas marrones repartidas en toda la superficie. Con óxido marmolado extendido desde la base del pedúnculo. Pedúnculo largo, grueso, flexible, carnoso, arqueado y de inserción oblicua. Pulpa amarillenta, firme, de sabor poco azucarado y con aroma a limón, en enero y febrero es más jugosa. Se recoge en octubre, pero tradicionalmente se maduraba en paja y no se consumía antes de enero, febrero o marzo.

consejo

Tradicionalmente se incubaba en la paja y no se consumía antes de enero, febrero o marzo.



LIMONERA

descripción

Variedad obtenida por *M. Baltet*, horticultor de *Trayes* (Francia) en el 1870. Árbol muy rústico y de rápida entrada en producción, indicada para zonas con inviernos largos y frío.

fruto

Fruto de calibre grande de forma piriforme. Piel de color verde amarillento con punteado y un poco de carmín en la parte soleada.



Pulpa blanca, un poco granulosa, azucarada, ligeramente perfumada y de sabor muy agradable. Se recoge hacia la tercera semana de julio.

MARTÍN SEC

descripción

El origen de esta variedad, del grupo de "Martine", es incierto pero muy antiguo. Según Leroy (1.870) podría ser procedente de la zona de la *Champagne*, según Galesio (inicio 800), era originaria de los *Alpes del Piamonte*, pero se cultivaba en toda la llanura Padana (Italia). En Francia se cultivó desde el siglo XVI y ya se llamó por C. Estienne el 1530. Existen varias variedades que tienen pocas diferencias entre ellas.

fruto

Fruto de tamaño pequeño - mediano, a veces casi redondo, algo irregular. Oval en la base y se ensancha hasta un tercio de su longitud. Piel fina pero rugosa, cubierta de un rojo empastado de un color de oxidado claro. Pulpa blanca pero que cambia de color en contacto con el aire. Crujiente, granulosa y un poco áspera. Muy jugosa, sabrosa, aromática y perfumada. Cosecha en noviembre.

consejos

Buena tanto cruda como cocida. Se puede conservar hasta el mes de febrero.



MOSCATELA – MAGALLÓN

descripción

Árbol vigoroso, porte con tendencia vertical. Los polinizadores más adecuados son: *castells*, *Ercolini* o *Blanquilla*.

fruto

Fruto de tamaño pequeño, redondeado irregular, sin cuello. Piel de coloración verde amarillenta, rojiza en la parte soleada. Pedúnculo largo o mediano, leñoso y bastante erguido. Pulpa casi blanca o amarilla crema claro, de buen sabor que recuerda al moscatel, azucarada, poco jugosa y un poco blanda. Recolección de finales de junio a principios de julio.

sinónimos

Leonardeta, *Magallón*, *Mosqueruela*, *Mosqueruela encarnada*.



MUSLO DE DAMA

descripción

Árbol de discreto vigor, productivo con ramas erectas y fuertes. Sensible al moteado.

fruto

Fruto grande de forma redonda oblonga, piel gruesa de color verde amarilla con manchas. La pulpa es azucarada, muy aromática de consistencia tierna, jugosa y fina. Madura el mes de agosto.

consejo

Se cocinaba con vino blanco y azúcar.



PASSA CRASSANA

descripción

Pera originaria de Francia fue desarrollada con uno de sus parentales reconocidos 'Doyenné d'Hiver' en 1845 y los primeros frutos se cosecharon en 1855. La variedad se cultivó en Italia, España y Francia y se importó a Inglaterra y Alemania, donde se convirtió en una fruta de lujo popular. Hoy en día, las peras Passe Crassane todavía se cultivan a pequeña escala en el norte de Italia, al sur de Francia y en la provincia de Lérica. Variedad rústica y resistente, buen polinizador.

fruto

Fruto muy grueso de forma cónica sin cuello, piel áspera de color verde, amarilla cuando madura. Carne de color blanca con textura fundente, jugosa, granulosa de sabor aromático, alimonado, muy bueno.

Maduración en octubre.



PIEL DE GALÀPET

descripción

Planta de forma irregular de vigor mediano.

fruto

Fruto de forma redonda y de tamaño entre pequeño y mediano. Piel de color verde uniforme con pecas marrón claro de superficie con surcos y seca. La pulpa es áspera, firme y crujiente. Se recoge en octubre.



PERA DE PUIGCERDÀ

descripción

La variedad de pera que se cultiva en Puigcerdà es la *Doyenné de Comice*. Variedad encontrada en Angers en el año 1849, árbol vigoroso y de producción constante.

fruto

Fruto grande de piel lisa, fina, de color amarillo claro o amarillo verdoso con coloración roja en la parte soleada. Pulpa blanquecina, fondant, azucarada, ácida, jugosa, dulce y perfumada. Maduración alrededor del mes de octubre.

sinónimos

Poire du Comice, Decana del Comizio, Beurré Robert, Roberts Butterbirne etc.



PERAL DE RECTORIA

descripción

Pendiente de caracterización



PERETA BLANCA

descripción



Fruto pequeño de diámetro de 3 cm con un pedúnculo largo hasta 5 cm, piel de color amarilla clara, pulpa granulosa, dulce, refrescante con sabor a limón. Madura a inicios de julio (Cruïlles).

PRIMERENCA DE TREVoux

descripción

Variedad obtenida por F. Trayve en Trévoux cerca de Lyon (Francia). Árbol de mediano a gran vigor, de rápida entrada en producción, de producción buena y regular.

fruto

Fruto de calibre mediano (180 gr), piel de color amarillo pálido con punteado verde, ligeramente rosada en la parte soleada. Pulpa blanca, jugosa, sabor de limón, azucarada y perfumada. Maduración hacia el mes de agosto (Cruïlles).

sinónimos

Précoce de Trévoux, Frühe von Trévoux, Trévoux.




ROCHA

descripción

Variedad de pera originaria de la región del oeste de Portugal, identificada por primera vez en 1836 en Sintra. Variedad que puede florecer con regularidad con pocas horas frío anuales (550 horas).

fruto

Pera de tamaño medio de forma oval, piriforme. Piel fina de color amarillo y verde con russeting típico rodeando el pedúnculo. Pulpa de color blanco, de consistencia dura y firme, crujiente, jugosa y dulce. Maduración en agosto-septiembre con muy buena capacidad de conservación.



SANTIAGO

descripción

Árbol de vigor mediano de copa irregular.

fruto

Fruto de tamaño mediano de forma sub-oval piriforme con corona obtusa, sin cubetas. Piel gruesa, lisa, muy aromática, de coloración amarillenta verdosa teñida de rojo intenso, con punteado verde abundante regularmente repartido. Pulpa blanca, azucarada, tierna y muy aromática. Se recoge a finales de julio, principios de agosto.



SERMENYA - SIETENBOCA

descripción

Variedad de pera muy difusa en toda la península donde coge diferentes nombres y a veces con características un poco distintas.

Fruto

Variedad veraniega, fruto de tamaño muy pequeño, redondeado y con la piel verde. Es una variedad con la pulpa muy dulce. Se recoge a medianos de junio y se guarda poco tiempo.

sinónimos

Pericona



TENDRAL DE REUS

descripción

Está considerada como una variedad local autóctona muy antigua, cuyo cultivo se centraba en comarcas muy definidas. Variedad de vigor medio.

fruto

Fruto de tamaño medio a muy grande, forma piriforme truncada, con cuello muy poco acentuado o casi nulo, ligeramente asimétrica. La piel es lisa y brillante de color de fondo amarillo verdoso con chapa de color rojo vivo. Carne de color blanco con textura firme y crujiente de sabor muy agradable, aromático, bueno.

Maduración durante la tercera decena de julio. Se puede conservar en buenas condiciones durante un mes en un ambiente refrigerado.

Imagen no disponible

WILLIAM

descripción

Originaria de Aldermaston, Berkshire, Inglaterra, donde apareció entre los años 1765-1770

fruto

Fruto de forma piriforme, de tamaño de medio a grande, piel de color verde claro que torna a un atractivo amarillo a la madurez, a veces con una tinta rosada en la cara expuesta al sol, con numerosas lenticelas bien visibles. La pulpa es blanco cremosa, de textura fina, típicamente aromática, muy jugosa, dulce, ligeramente granulada. Se cosecha **a principios de agosto** y los frutos, si se enfrían adecuadamente, se conservan durante más de cinco meses.

sinónimos

Williams Bon Chrétien o Bartlett



MELOCOTONEROS

ÉPOCA DE FLORACIÓN

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
AMSDEN					
BELGA					
BENVINGUT					
BLANC DE PARET DEL VALLÈS					
CANONGI DE CANONJA					
COTOGNO DI ROSANO					
DIXIRED					
ESCAROLITA					
GAVATX					
MALLORQUÍ					
MELICOTO GROC					
MELOCOTON DE CALANDA					
MIRAFLORES					
MOLLAR VERMELL					
POLLERO					
PRESSEC VERMELL					
RESCLOS					
RONDAN					
ROQUETA					
ROQUETA GELAT					
SANT LLORENÇ					
SUDANELL					
VINYA					

ÉPOCA DE MADURACIÓ

VARIETAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AMSDEN								
BELGA								
BENVINGUT								
BLANCO DE PARET DEL VALLÈS								
CANONGI DE CANONJA								
COTOGNO DI ROSANO								
DIXIRED								
ESCAROLITA								
GAVATX								
MALLORQUÍN								
MELICOTÓ AMARILLO								
MELOCOTÓN DE CALANDA								
MELOCOTÓN ROJO								
MIRAFLORES								
MOLLAR ROJO								
POLLERO								
RESCLOS								
RONDAN								
ROQUETA								
ROQUETA HELADO								
SAN LORENZO								
SUDANELL								
VIÑA								

AMSDEN

fruto

Fruto entre mediano y grande, piel de color rojo, pulpa blanca cremosa, fina, jugosa, dulce. Maduración a principios de julio (Cruïlles).



BELGA

descripción

Árbol de mediano vigor con puerto medio abierto.

fruto

Fruto de tamaño entre mediano y grande (80-85 mm de diámetro), ligeramente chata, piel de color amarillo-verdoso con manchas estriadas de color rojizo al punto del pistilo. Pulpa de coloración amarillo-crema, fondant, aroma muy peculiar y de aspecto atractivo. Cosecha a partir de finales de junio.



BENVINGUT

descripción

Variedad catalana, también conocida como Peret en el Camp de Tarragona. Árbol de vigor medio, porte con tendencia erguida de las ramas, variedad que parece exigente en horas de frío. Floración mediana (finales de marzo). Tiende a una caída del fruto prematura.

fruto

Fruto redondeado, de tamaño mediano de caras asimétricas, a veces longitudinalmente coloreada de rojo. Piel de color amarillo pálido, manchas rojas poco intensas con aspecto difuminado. Pulpa jugosa y dulce. Conserva el color amarillo en preparaciones en almíbar. Se recoge a finales de junio.

consejo

Se había utilizado para la obtención de destilados aromáticos.



BLANCO DE PARET DEL VALLÈS

descripción

Variedad muy temprana encontrada en el pueblo de Mollet del Vallès

fruto

Fruto de pulpa blanca, muy dulce y jugosa, aromático con piel blanca con sobrecolor rojo intenso distribuido de forma bastante uniforme.



COTOGNO DI ROSANO

descripción

Variedad muy antigua originaria de Rosano, pequeño pueblo a las afueras de Florencia.

fruto

Los frutos a menudo tienen forma irregular y asimétrica, con una línea de sutura a veces incluso profunda. La piel es amarilla con sobrecolor rojo. Carne de color amarillo intenso y rojo alrededor del hueso. La pulpa es muy dulce, compacta y adherente al núcleo con perfume muy intenso. Se recoge a **finales de agosto principios de septiembre**.



DIXIRED

descripción

Árbol muy vigoroso y muy productivo.

fruto

Los frutos son medios - grandes, piel de color rojo muy intenso, pulpa amarilla con alguna veta de color rojo, consistente, jugosa, semi-desprende a madurez.

Maduración a finales de junio / principios de julio.



ESCAROLITA

descripción

Varietal catalana. El árbol es medianamente vigoroso, con abundante floración y de producción buena y constante.

fruto

Fruto de forma esférica achatada a veces asimétrica. Tamaño de mediano a pequeño y pulpa de color amarillo uniforme, dulce. Maduración a mediados de julio.



GAVATX

descripción

Árbol de vigor medio con porte medio abierto.

fruto

Melocotonero con piel de coloración rojiza en la cara donde le da el sol. Pulpa blanca y jugosa. Maduración hacia el mes de agosto.

Imagen no disponible

GAVATX SANTIAGO

descripción

Árbol con vigor de medio a vigoroso.

fruto

Fruto redondeado con pezón bastante visible (fuerza patente) con piel amarillo verdosa recubierta de color rojizo en la cara soleada. Carne de coloración blanca con buena calidad gustativa. Cosecha hacia la última decena de julio.

consejo

Cae cerca de la madurez comercial. Recoger un poco antes.



GAVATX BLANDO

descripción

Árbol de vigor mediano de porte medio abierto.

fruto

Fruto de forma redondeada, piel de color amarillo verdoso a amarillo paja, manchas rojas opuestas elipsoides, a veces con franjas o estrías que pueden cubrir el 50% del fruto. Pulpa blanca, maduración hacia el 15 de julio.

sinónimos

También conocido como Mal parit o Gavatx Belga.



MALLORQUÍN

fruto

Fruto de calibre medio, carne amarilla ligeramente jugosa, dulce de sabor exquisito. Maduración hacia el **15 de agosto**

sinónimos

Muy similar a la variedad conocida en Italia como Cotogno di Rosano.



MELOCOTÓN AMARILLO

descripción

Árbol de poco o medio vigor.

fruto

Fruto de forma esférica con un surco profundo longitudinal, de tamaño mediano. Piel de color amarillo-blancuecino y amarillo intenso en la parte expuesta al sol, se desprende con dificultad de la pulpa. Pulpa blanca anaranjada, compacta, de sabor dulce, ácido y muy aromático. Maduración principios de julio (Cruïlles - Baix Empordà).



MELOCOTÓN DE CALANDA

descripción

Varietal que se cultiva de forma tradicional en la comarca del Bajo Aragón (localidad de Calanda) desde la Edad Media. Este cultivo se caracteriza por el proceso de embolsado previo a su maduración.

fruto

Fruto de gran tamaño, color amarillo uniforme y sin estrías, con exquisito aroma y un sabor dulce propio. Recolección muy tardía a **finales de setiembre**.



MOLLAR ROJO

descripción

Árbol de vigor notable y de altura mediana.

fruto

El fruto es de forma ovoide redondeada, de tamaño mediano, con piel de color de fondo amarillo-verdoso marmolado de rojo, fina y aromática. La pulpa es de color blanco, rojiza alrededor del hueso, de sabor dulce, muy jugosa y se desprende del hueso, perfumada. Se recoge hacia finales de agosto (Cruïlles - Baix Empordà).



MELOCOTÓN ROJO

fruto

Fruto de tamaño grande, con piel de coloración rojiza. La pulpa es firme, jugosa y de coloración blanco-crema. Se recoge en septiembre.



RESCLÓS

descripción

Árbol vigoroso con tendencia de los ramos con un puerto vertical, muy productivo.

fruto

Fruto de forma redonda ligeramente asimétrica. Piel amarilla con franjas estrechas difuminadas y rojizas. La pulpa es amarilla, consistente, y jugosa. Gracias a su intenso aroma es apta tanto para el consumo fresco como para las conservas. Recolección tardía a mediados de septiembre.



RONDAN

descripción

Árbol de vigor mediano.

fruto

Fruto ligeramente alargado de piel amarilla uniforme con una línea de sutura bastante marcada. Típica pavía o melocotón de viña con cualidades gustativas de carne y aroma muy apreciables. Maduración a finales de agosto.



ROQUETA HELADO

descripción

Varietal de origen catalana, árbol muy vigoroso. Producción muy elevada y constante.

fruto

Pavía de mida entre mediana y pequeña (80/95 gr), pulpa amarilla clara, muy consistente y de textura fina, muy dulce, medianamente aromática, de elevada calidad. Muy adecuada para preparar con almíbar. Piel amarilla con coloración rojiza, punteada en la cara donde le toca el sol. Se recoge hacia medianos de agosto (Cruïlles).




ROQUETA

descripción

Árbol de vigor mediano, de regularidad productiva, el fruto no cae en la maduración.

fruto

Pavía con piel de color amarillo, con una parte rojiza y virado irregularmente de rojo. La calidad gustativa mejora mucho si se deja llegar a la madurez fisiológica que se produce a principios de septiembre.



ALBARICOQUEROS

ÉPOCA DE FLORACIÓ

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
ANTONIO ERRANI		■			
CANINO		■	■		
GALTA ROJA		■			
MIRLO BLANC		■			
MONIQUI			■		
PAVIOT					
PISANA					
PORTICI		■			
PRECOCE D'IMOLA			■		
ROIG DE ROUSSILLON			■		
TADEO					

ÉPOCA DE MADURACIÓ

VARIEDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANTONIO ERRANI		■						
CANINO		■	■					
GALTA ROJA		■						
MIRLO BLANC	■		■					
MONIQUI		■	■					
PAVIOT			■	■				
PISANA				■				
PORTICI		■	■					
PRECOCE D'IMOLA		■	■					
ROIG DE ROUSSILLON				■				
TADEO				■				

ANTONIO ERRANI

descripción

Variedad que se adapta bien en las regiones cálidas, de gran vigor i se puede considerar autofértil.
Variedad de maduración temprana.

fruto

Frutos medianos y redondos, de color amarillo anaranjado. Pulpa jugosa y dulce. Maduración a principios de junio.



CANINO

descripción

Variedad de origen española. El árbol es muy vigoroso, resistente a los parásitos y a la caída del fruto. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

fruto

Fruto regular, casi redondo, de tamaño grande a muy grande. Color amarillo anaranjado intenso, prácticamente rojo en la parte expuesta al sol. La pulpa es firme, de sabor excelente, medianamente perfumado. Se recoge a mediados de junio. Se conserva bien y es resistente al transporte.



GALTA ROJA

descripción

Es una variedad de origen valenciana y una de la más consumida en la península. El árbol de porte semi-erecto y fuerza vigorosa.

fruto

Fruto de calibre medio, de color entre blanco y amarillo y con la mejilla de color rojo donde le da el sol. La carne es blanca, jugosa y dulce.
Madura a **principios de junio**.



MIRLO BLANCO

descripción

Árbol de gran vigor, semi-abierto y de buena productividad.
Resistente a Sharka

fruto

Fruto de color naranja claro, con chapa roja donde le toca el sol, carne naranja claro, firme.
Maduración temprana a **medianos de mayo**.

Imagen no disponible

MONIQUÍ

descripción

Árbol de vigor medio y de porte erguido, con necesidades medianas en las horas de frío durante el invierno. Autofértil. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

fruto

El fruto es de buen tamaño, de forma redonda-triangular. Piel de color blanco crema, de aspecto transparente. Pulpa blanca y jugosa, aromática, perfumada y azucarada. Hueso semi-adherido.



Óptimo para consumir fresco. Floración mediana. Maduración desde finales de junio hasta principios de julio.

PAVIOT

descripción

Antigua cultivar de origen francés obtenida de una semilla polinizada de *Hatif du Clos de Paviot* (Rhone). Árbol medianamente vigoroso.

fruto

Fruto grueso de forma oval, piel anaranjada con zonas verdes claras y con un color rojizo. Pulpa amarilla fina, azucarada, perfumada. Es una de las mejores variedades tardías. Madura la última semana de julio.



PISANA

descripción

Cultivo de origen italiano obtenida en el DCDSL de Pisa. Árbol de vigor mediano, productividad media-elevada, constante y autofértil.

fruto

Los frutos tienen buen aspecto, color de fondo amarillo, forma oval de tamaño grande y consistente. El sabor es óptimo, con una jugosidad elevada y un intenso aroma. Época de maduración tardía, principios de agosto.




PORTICI

descripción

Varietal vigorosa seleccionada por el Instituto. Colture Arboree de Portici. Productividad elevada y constante, autofértil.

fruto

Fruto de tamaño medio-grande (peso medio 56 g), color amarillo anaranjado y aroma excelente. La pulpa es firme, de textura media fina, de color anaranjado, destaca, con buenas cualidades gustativas. También excelente para almíbar y secado. Cosecha a finales de junio, principios de julio.



PRECOZ DE IMOLA

descripción

Originaria de la Emilia Romagna (Italia). Muy vigorosa.

fruto

Fruto mediano-grande con la piel amarilla y con zonas verde claro. Pulpa naranja, bastante compacta, perfumada y sabrosa. Madura a finales de junio, principios de julio.



ROUGE DE ROUSSILLON

descripción

Variedad autofértil originaria de la Cataluña Norte.

fruto

La forma del fruto es oval con piel aterciopelada, de color calabaza punteada de rojo. Buena calidad gustativa y ligeramente acidulo. Ideal para hacer mermeladas. Variedad tardía, cosecha **entre finales de junio y principios de julio.**



TADEO

descripción

Variedad tardía valenciana

fruto

Fruto de buen calibre, forma redondeada, de buen gusto y aromático, carne firme y amarillenta. Madura en la **segunda mitad de julio.**



ALMENDROS

ÉPOCA DE FLORACIÓ

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
FERRAGNES					
GARRIGUES					
GUARA					
LLARGUETA					
MARCONA					

ÉPOCA DE MADURACIÓ

VARIEDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FERRAGNES								
GARRIGUES								
GUARA								
LLARGUETA								
MARCONA								

BEQUERUDA

descripción

Variedad recolectada en la provincia de Lleida

fruto

Almendra de cascara blanda y de forma alargada. Maduración durante el mes de **septiembre**.

Imagen no disponible

DESMAYO LARGUETA

descripción

Árbol de vigor medio-alto con puerto abierto. Variedad muy cultivada en Cataluña y en todo el valle del Ebro, desde Zaragoza hasta Tarragona y en las provincias limítrofes de Lleida y Teruel. Variedad productiva, de floración precoz a principios de febrero, aunque parece dotada de una cierta resistencia al frío.

fruto

Fruto de excelente calidad con muchas aplicaciones, de cáscara dura y forma alargada. Maduración tardía hacia **finales de septiembre y principios de octubre**.

consejo

Es la única variedad española que se tuesta correctamente con piel.




FERRAGNES

descripción

Variedad originaria de Francia. Árbol de porte recto y poco ramificado. Época de floración tardía y buena resistencia al frío.

fruto

Fruto de cascara semi-mollar, de forma alargado y estrecho.




GARRIGUES

descripción

Variedad vigorosa y muy productiva. Recomendable como variedad base, se puede utilizar como portainjerto, o como polinizadora de Marcona, autofértil. Variedad muy rustica, aconsejable para cultivo de secano.

fruto

Almendra pequeña y con cáscara muy dura, se recoge en septiembre.




GUARA

descripción

Árbol de medio vigor, resistente a la sequía, floración tardía (primera / tercera semana de marzo), autofertil de rápida entrada en producción.

fruto

Fruto de cáscara dura, almendra en forma de corazón, grande de cosecha precoz, hacia **finales de agosto**.



MARCONA

descripción

Variedad muy cultivada en Cataluña. Precoz a entrar en producción y muy productiva. Floración media, hacia mediados de febrero.

fruto

Fruto de forma redondeada, de extraordinaria calidad, es la más valorada para elaborar mazapán o turrón duro. Maduración durante el mes de **septiembre**.



CIRUELOS

ÉPOCA DE FLORACIÓN

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
ANNA SPATH		■			
BIRICOCCOLO					
COLLÓ DE FRARE		■	■		
COLLÓ DE MICO - ROGETA D'AGOST			■		
D'AGEN A045			■		
D'AGEN A048			■	■	
D'AGEN A065		■			
D'AGEN A098					
FRARE NEGRE		■			
LLAGRIMA D'OR			■		
LLEVADOR		■	■		
MADUIXADA					
MIRABELLA DE NANCY		■	■		
MONSTRUOSA D'ANGLATERRA			■		
MONSTRUOSA DE REUS		■	■		
QUETSCHÉ ALSACIA					
REINA CLÀUDIA D'ALTHAN					
REINA CLAUDIA D'OULLINS			■		
REINA CLÀUDIA TOLOSA			■		
REINETA - REINA CL. VERDA			■	■	
ROGETA D'AGOST			■		
RUSTICANO		■			
SANT JOAN			■		
SANT MIQUEL			■		
SCAGNARDA			■		
VALLESPÍR		■	■		

ÉPOCA DE MADURACIÓ

VARIEDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANNA SPÄTH					■	■		
BIRICOCOLO			■	■				
COJÓN DE FRAILE			■	■				
COJÓN DE MONO - ROGETA				■	■			
DE AGOST				■	■			
DE AGEN				■	■			
FRARE NEGRO				■	■			
LÁGRIMA DE ORO					■			
LLEVADOR		■						
MADUIXADA		■						
MIRABELLA DE NANCY				■	■			
MONSTRUOSA DE INGLATERRA				■	■			
QUETSCHES ALSACIA					■	■		
REINA CLAUDIA DE ALTHAN			■	■				
REINA CLAUDIA DE OULLINS			■	■				
REINA CLAUDIA TOLOSA					■			
REINETA - REINA CL. VERDA			■	■				
REINA CLAUDIA VIOLETA					■	■		
RUSTICANO		■						
SAN JUAN		■						
SAN MIGUEL					■	■		
SCAGNARDA			■					
VALLESPÍR		■						

ANNA SPÄTH

descripción

Variedad originaria de Hungría y comercializada en Alemania por el viverista Späth en Berlín hacia el 1870. Árbol de mediano vigor con porte erecto, rústico y de fácil adaptación. Floración tardía (primera década de abril), autocompatible, de productividad constante, entre media y elevada.

fruto

Fruto de calibre medio-grande, piel pruinosa de coloración rojopúrpura hasta azul-violácea. Pulpa amarillo-verdosa, soda, se separa del hueso, poco jugosa, azucarada, dulce y aromática. Maduración entre finales de agosto y principios de septiembre.



BIRICOCCOLO

descripción

Fruta antigua, probablemente es un híbrido natural entre la ciruela mirabolano y el albaricoque, también es conocida como Albaricoque del Papa. Fue descrita por primera vez por Henry Louis Duhamel du Monceau en el libro *“Traité des arbres fruitiers”* (1768) y le dio el nombre de “Abricot noir”. Más tarde apareció con el nombre de Abricot violet, en el catálogo de árboles frutales de los abades parisinos Nolin y Blavet (1775). En Italia existen diferentes variedades, posiblemente originarias de la provincia de Boloña y de la zona del Vesubio (fruto más grande) presentes desde principio de 1800. Árbol de vigor medio con una producción buena y constante. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

fruto

Fruto atractivo, redondo, mediano-pequeño con la piel lisa, delgada, ligeramente peluda, de color naranja-violeta. Pulpa de color rojo-anaranjado, dulce, poco consistente, de sabor ácido que recuerda al albaricoque con aroma a ciruela. Se recoge en julio.



COJÓN DE FRARE

descripción

Árbol común en la zona del Ampurdán. Todavía se encuentran en los márgenes de antiguos cultivos.

fruto

Fruto oviforme, grande, piel de color amarillo. Pulpa de color amarillo-verdoso que en plena maduración pasa a ser de color amarillo-dorado. Textura firme, jugosa de sabor azucarado muy intenso. Madura entre **julio y agosto**.



COJÓN DE MONO - ROGETA DE AGOSTO

descripción

Parece ser que es originaria de California, de allí llegó a Francia y de Francia a Sant Boi de Llobregat (Cataluña) el año 1955. Árbol vigoroso y de porte semi-erguido.

fruto

Fruto de forma elíptica con promontorio muy evidente en la inserción con el pedúnculo, surco de medio profundo a profundo, ligera asimetría. La piel es de color rojo y la pulpa es amarilla. Se recoge desde finales de agosto hasta principios de septiembre.

sinónimo

Roja de agosto, Rogeta, Collo de mico, Collo de Bou, Clàudia Catalana Toscana, Monstruosa de París. També es conocida como "*la del Manelet*" debido a que Manel Perelló fue de los primeros agricultores del Baix Llobregat en cultivarla.



DE AGEN

descripción

Buen polinizador y autofértil.

fruto

Fruto de forma ovalada, grande, con la piel fina de color violeta. Carne de color amarillo-verde, muy dulce. Gusto excelente, ideal para hacer mermeladas y para comer cruda. Es una de las variedades más utilizadas para hacer prunas secas. Se recoge a **finales de agosto hasta principios de setiembre.**




FRAILE NEGRO

descripción

Árbol de altura mediana con forma redondeada y de buena producción.

fruto

Fruto oviforme, grande, piel de color violeta oscuro. Pulpa de color amarillo-verdoso que en la maduración pasa a ser amarillo-dorado. Textura firme, jugosa, de sabor azucarado intenso. Madura en agosto.



LÁGRIMA DE ORO

descripción

Árbol de vigor mediano, bastante rústico y productivo. Floración hacia mediados de abril.

fruto

Fruto de forma original, elipsoide bastante asimétrico y surco longitudinal semi-profundo, promontorio alrededor del pedúnculo. Piel de color amarillo y pulpa sabrosa. Se recoge los primeros diez días de septiembre.

sinónimo

Reineta Francesa.



LLEVADOR

descripción

Al ser un árbol de vigor medio permite una buena poda en formación de vaso.

fruto

Fruto de calibre pequeño, redondeado con tendencia ligeramente elíptica. Piel amarilla con mancha roja bastante uniforme que puede abarcar más del 50%. Pulpa dulce y aromática para el consumo en fresco. Variedad temprana, primeros diez días de junio.



MIRABELLA DE NANCY

descripción

Árbol de vigor mediano con ramas muy largas con tendencia a abrirse y colgarse hasta casi llegar al suelo. Autoestéril, resistente al frío, pero prefiere climas cálidos. Variedad muy antigua (1420), originaria de la zona entre Nancy y Metz (Francia).

fruto

Fruto pequeño, de forma generalmente redondeada-oval, achatada con el peciolo largo. Piel amarillenta-clara con difuminados blancos, con puntos rojos sobre todo cerca del pedúnculo. Pulpa amarillenta-clara, consistente, jugosa, dulce, ligeramente acidula, de sabor excelente y finísimo, se desprende del hueso. Madura la segunda mitad de agosto.



consejo

Adecuada para hacer conservas y mermeladas.

MONSTRUOSA DE INGLATERRA

descripción

Árbol de buen vigor.

fruto

Fruto de forma ovalada, de calibre grande, piel de color rojo. La pulpa es amarilla, jugosa y azucarada. Variedad muy apreciada en el mercado por su consumo fresco. Maduración a mediados de agosto.



QUETSCHÉ DE ALSACIA

fruto

Fruto de tamaño grande, piel de color rojo-azul oscuro, carne de color amarillo-verdoso, semi-fina, semi-tierna, dulce y no jugosa. Ideal para pasteles. Se recoge hacia el mes de septiembre.



REINA CLAUDIA DE ALTHAN

descripción

Llegó de Hungría en 1860. El árbol es medianamente vigoroso con estructura en altura y de escasa productividad, autoestéril.

fruto

El fruto es de tamaño grande y tiene forma esférica. La piel tiene un color de fondo amarillento con un sobrecolor rojo violeta en el 90% de su superficie, revestido de *pruina*. La pulpa es de color amarillo rojizo, discretamente dura, se separa del hueso y tiene un sabor óptimo. Madura a finales de julio, principios de agosto.



REINA CLAUDIA DE OULLINS

descripción

Antigua variedad francesa encontrada en Coligny (Francia), probablemente originada por una semilla de Reina Claudia Verde y multiplicada por Massot de Oullins, cerca de Lyon. Introducida en España hacia 1860. Árbol poco vigoroso de porte bastante erguido. La producción es buena y regular.

fruto

Fruto redondeado, un poco elíptico, ligeramente asimétrico, de tamaño grande (45 gr.). La piel es blanca verdosa y dorada amarillenta cuando madura. Pulpa amarilla, fina, jugosa y dulce. Maduración hacia mediados de julio.

sinónimos

Reina Clàudia amarilla, Falsa Clàudia, Reina Claudia francesa, Francesa Monstruosa, Francesa Verde, Regina Claudia Monstruosa, Regina Claudia Gialla i Golden Cage



REINA CLAUDIA TOLOSA

descripción

Varietal obtenida en Bélgica hacia 1841 de una semilla de Reina Claudia Verde. Árbol de vigor medio y de porte semi-erguido que se va abriendo al paso de los años. Floración semi-temprana, con un porcentaje de autofertilidad muy elevado.

fruto

El fruto es redondeado, ligeramente alargado con un surco medio profundo y poco asimétrico. Piel verdosa o verdosa amarillenta. La pulpa también es verdosa amarillenta. La pulpa es aromática, firme, bastante jugosa, dulce y por lo tanto de gran calidad gustativa. Es una variedad interesante ya que es una Claudia de maduración tardía, primera mitad de septiembre.

sinónimos

Monstruosa de Bavay, Reina Clàudia de Bavay, Sainte Claire, Reine Claude de Monot.



REINETA O REINA CLAUDIA VERDE

descripción

Varietal muy antigua, probablemente es la variedad madre de todas las reinas claudias. Origen dudoso, puede ser italiano y llevada hasta Francia para dedicarla a la Reina Claudia (primera esposa de Francisco I, nacida en 1499) o también es posible que llegara a Francia desde el Oriente Medio. Según Forney, 1863, podría ser originaria de la *Loira*, Francia. Varietal citada por primera vez por *Le Lectier d'Orléans*, el año 1628. Llevada a Inglaterra en el 1724 por W. Gage. Árbol de vigor medio a alto, de porte abierto, medianamente productivo. Necesita polinización por *Falsa Claudia* o *Claudia Tolosa*.

fruto

Fruto redondeado casi simétrico, pedúnculo de corto a medio. Calibre de pequeño a mediano, piel de color verde intenso incluso en la maduración. La pulpa es de color amarillento-verdoso, jugosa, dulce, de alta calidad gustativa, quizás es la más aromática y agradable de las claudias. Óptima para el consumo fresco, para la elaboración de mermeladas e incluso para secar. Maduración de finales de julio a principios de agosto.



REINA CLAUDIA VIOLETA

descripción

Varietal citada por Duhamel en el año 1768, por Leberryais en el 1789, por Noisette en el 1828, según Baldini (n.10) fue obtenida por Galopin de Liège (Bélgica). Árbol vigoroso de porte abierto, la entrada en producción puede ser un poco tardía, muy productivo y constante.

fruto

Fruto de calibre mediano, esférico, simétrico con la piel de color azul intenso. La pulpa es amarillenta-verdosa, fina, jugosa, bastante firme, perfumada y de sabor óptimo. Se recoge hacia finales de agosto, principios de septiembre.

sinónimos

Reine-Claude Violette, Violette Reneklode, Reine Claude Alexandre Dumas, Violet Gage, Violet Queen Gage, etc.



RUSTICANO

descripción

Ciruelo europeo de buenas características como polinizador. Floración hacia medianos de marzo.

fruto

Varietal antigua de fruto esférico, mediano-pequeño. La piel es roja y a medida que va madurando se vuelve negro. La pulpa es dura y crujiente. Se consume verde porque cuando está madura es muy dulce. Madura a finales de junio.



SAN JUAN

descripción

Típica variedad local (Garrotxa, Cataluña) de ciruelo temprano.

fruto

Fruto de calibre pequeño de forma oval-alargada. La piel es verdosa-amarillenta, pulpa verde-amarilla, dulce. Maduración a finales de junio.



SAN MIGUEL

descripción

Árbol alto, de vigor fuerte y de porte con forma de fuso.

fruto

Fruto de forma oval alargada, de tamaño mediano. Piel fina, de color amarillo-dorado cubierta de pruina blanca. La pulpa es de color amarillo-verdoso, firme, su sabor recuerda al albaricque. Se recoge a mediados de septiembre.

consejo

Los frutos se pueden usar para secar y cocer.



SCAGNARDA

descripción

Varietal tradicional difundida hace tiempo en la zona de los Apeninos italianos. Actualmente todavía se encuentra en *l'Oltrepò pavese*, al oriente de la provincia de *Piacenza* y en *Monferrato*. El 1824 el pomólogo *Giorgio Gallesio* la describió en su "Diario de viaje", cuando hizo un viaje a Milán. El nombre *Scanarda* o *Scagnarda* deriva de una expresión del dialecto de la zona entre *l'Oltrepò pavese* y la zona de *Piacenza*: "da sgagnare" (para morder). **Ciruela de Damasco**. Árbol de vigor mediano de porte expansivo.

fruto

Fruto mediano, de forma oval más bien alargada. Piel de color amarillo-dorado, pulpa carnosa, medianamente jugosa, se desprende del hueso. Madura a finales de julio.



VALLESPİR

descripción

Mirabolano vigoroso sobre todo en edad juvenil se necesita una cuidadosa poda de formación.

fruto

Fruto de calibre pequeño, esférico algo aplanado. Piel de color entre rosado y rojizo con fondos amarillento. Pulpa dulce y aromática para el consumo en fresco. Maduración hacia **mediados de junio**.



CEREZOS

ÉPOCA DE FLORACIÓ

VARIETAT	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY
AIGUARDENT		■			
BIG. GEANT D´HEDELFINGEN		■	■		
BIGARREAU BURLAT		■			
BIGARREAU MORREAU		■	■		
COR DE COLOM		■	■		
CUA LLARGA		■			
DE CABRIANES		■			
DEL GRA		■			
D'EN ROCA		■			
DURONE DE CESENA		■	■		
DURONE DI VIGNOLA III		■	■		
MORA DE VIGNOLA		■	■		
PICOTA - AMBRUNÉS		■	■		
SANT ISIDRE		■	■		
SANT PERE		■	■		
SELRANA					
TIRITOS			■		

ÉPOCA DE MADURACIÓ

VARIETAT	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AIGUARDENT		■						
BIGARREAU BURLAT	■	■						
BIG. GEANT D´HEDELFINGEN		■						
BIGARREAU MORREAU	■	■						
BIGARREAU TARDÀ VIGNOLA		■	■					
COR DE COLOM	■	■						
CUA LLARGA	■	■						
DE CABRIANES		■						
DEL GRA		■						
D'EN ROCA		■						
DURONE DE CESENA		■						
DURONE DI VIGNOLA III		■						
MORA DE VIGNOLA		■						
PICOTA - AMBRUNÉS		■	■					
SANT PERE		■	■					
SANT ISIDRE	■	■						
SELRANA	■	■						
TIRITOS	■	■						

AIGUARDIENTE

descripción

Guindo de vigor notable, de porte con forma de huso, de altura considerable con ramas erguidas. Floración la última semana de marzo en la Garrotxa (Cataluña).

fruto

Fruto de forma alargada, de tamaño mediano, piel fina de color rojo intenso. Pulpa de color rojo-granate, tierna y jugosa, de sabor muy ácido si no está bien madura. Recolección a **finales de junio**.

consejo

Variedad que se usaba en maceración para la preparación del aguardiente dulce.



BLANCA

descripción

Antigua variedad encontrada en la Garrotxa.

fruto

Fruto de buen calibre, la piel es blanca, tiende al amarillo pajizo cuando madura. Carne dulce, amarilla y consistente. Maduración hacia **mediados de junio**.

consejo

El color de la piel no es atractivo para los pájaros.



BIGARREAU BURLAT

descripción

Sin duda en Francia es la variedad más extendida de las Bigarreau.

fruto

Fruto de tamaño grande, piel de color rojo oscuro y brillante. Pulpa firme, crujiente, azucarada y jugosa. Excelente variedad para el consumo en fresco. Variedad temprana, maduración entre finales de mayo y principios de junio.



BIGARREAU GEANT D'HEDELFINGEN

descripción

Variedad muy productiva y de floración tardía. Se considera una de las mejores variedades polinizadoras.

fruto

Fruto de calibre grueso con piel de coloración roja brillante que se vuelve púrpura cuando madura. Pulpa firme, jugosa y perfumada. Se recoge a finales de junio.



BIGARREAU MORREAU

descripción

Árbol muy fértil con floración temprana.

Fruto

Fruto grueso con piel de color rojo oscuro, pulpa firme, azucarada y no adherente al hueso. Maduración hacia finales de mayo.



BIGARREAU TARDÀ DE VIGNOLA

fruto

Bigarreau con fruto de color rojo oscuro y de sabor inconfundible. Pulpa roja, firme, bastante jugosa, azucarada y de sabor óptimo. Se recoge a mediados de junio.



CORAZÓN DE PICHÓN

descripción

Árbol vigoroso de forma cónica y de gran altura con ramas que cuelgan.

fruto

El fruto tiene forma de corazón, de tamaño mediano. La piel es amarillenta con tonalidades rosadas en la parte expuesta al sol. La pulpa es amarillenta, firme, dulce y de buen sabor. Madura en mayo-junio.



COLA LARGA

descripción

Árbol vigoroso de porte erguido. Floración temprana.

fruto

Fruto de calibre mediano de forma globular y con pedúnculo largo. La piel es delgada y roja y la pulpa es rosada y muy adherente al hueso. Fruto de buena calidad gustativa y resistente al transporte. Recolección a finales de mayo.



D'EN ROCA

descripción

Con una procedencia que las sitúa a principios del siglo XIX entre la Catalunya Nord y el Empordà fue introducida en el Maresme por la familia Roca. Hoy en día localizada en la zona de influencia de Arenys de Munt.

fruto

Es una variedad que se reconoce por sus dimensiones grandes, la forma de corazón redondo, coloración roja con algún punto amarillento. Es una de las variedades de cerezas más tardías por lo que se puede encontrar en el mercado desde finales de junio hasta finales de julio.



MORA DE VIGNOLA

descripción

Varietal autóctona de los alrededores de la ciudad de Vignola, en la provincia de Módena.

fruto

El fruto es de tamaño mediano, redondo y de forma simétrica. La piel es brillante y casi negra en los frutos maduros. Pulpa tierna, muy jugosa, de color rojo oscuro casi negro. El sabor es dulce, un poco ácido y fragante. La maduración se produce entre finales de mayo y los primeros diez días de junio.

sinónimos

Moretta di Vignola



PICOTA - AMBRUNÉS


descripción

Árbol de vigor medio con porte semi-erecto.

El nombre de picota responde a un grupo de variedades de cereza de procedencia local del Valle del Jerte (Norte de Cáceres). Su principal característica es que se comercializan sin pedúnculo.

fruto

Frutos de calibre mediano y hueso grande, color púrpura y carne dulce, tersa y firme, resulta crujiente en la boca. Resistente al transporte, muy productiva, tardía, se recolecta a **finales de junio**.



SAN ISIDRO

descripción

Árbol de buen vigor de porte de media altura. Floración, la tercera semana de marzo.

fruto

Fruto con forma de corazón redondeado de calibre grande. Piel fina de color púrpura con difuminado rojo. Pulpa tierna, fina con jugo abundante y colorado. Fruto de buena calidad gustativa. Variedad temprana que se recoge a finales de mayo.



SAN PEDRO

descripción

Árbol de medio vigor, hoja con limbo muy cerrado, característico de las cerezas conocidas como fuertes.

fruto

Fruto de calibre entre mediano y pequeño, de forma alargada, pedúnculo muy largo, piel de color rojo-amarillento en una cara y la otra amarilla. Pulpa consistente y por lo tanto, aparte de un consumo en fresco, se presta para la preparación de licores. Se cosecha a mediados de Junio (Begues - Barcelona).



SELRANA

descripció

Antigua varietat local de Terrades (Alt Empordà).

fruto

Fruto con pedúnculo largo, de forma puntiaguda y de pequeño tamaño. La piel es delgada de color amarillenta-rosada con tonalidades rojizas en la parte soleada. Pulpa amarilla, tierna, jugosa, de sabor dulce-acídulo. Cosecha a finales de mayo - principios de junio (Cruïlles - Baix Empordà).



TIRITOS

descripció

Árbol de medio vigor, fruto de tamaño medio (7 gr.), piel de color rojo uniforme.

fruto


Es aconsejable cosechar los frutos muy al punto de su madurez, porque cuando madura pierde jugo por la zona de inserción del pedúnculo. Pulpa de buen sabor, madura hacia la tercera semana de mayo (Baix Llobregat).




HIGUERAS

AMARILLA		
descripción	Higuera veraniega	
fruto	Fruto de calibre entre pequeño y mediano, dulce, piel muy fina, pulpa amarilla. Maduración el mes de julio	
BLANQUELLA – D'ALACANT BLANCA		
descripción	Árbol de vigor medio con ramas que cuelgan con hojas trilobadas y enteras, variedad muy productiva.	
fruto	Los higos son tempranos se recogen a finales de agosto en el Baix Empordà. Color de la piel amarillo y como elemento característico la pulpa del higo fresco es de color amarillo.	
consejo	Tradicionalmente se consume como higo seco.	
sinónimos	D'Alacant, Alacantina, Galantina, Blanca, Blanqueta.	
CUELLO DE DAMA BLANCA		
descripción	Árbol vigoroso, porte semi-erguido, poco ramificado.	
fruto	Fruto grande, piriforme, piel amarilla-verdosa, pulpa de color rojo a rojo intenso, fina, azucarada, de excelentes cualidades gustativas. Maduración hacia septiembre.	
CUELLO DE DAMA NEGRA		
descripción	Árbol vigoroso, más ramificado que el Cuello de Dama Blanca.	
fruto	Fruto grande, piriforme, piel de color morado, pulpa rosa oscura a roja intensa, fina, azucarada. Maduración alrededor del mes septiembre hasta finales de octubre.	


CUELLO DE DAMA RAYADA

descripción	Variedad bastante común en les Illes Balears (encontrada a Menorca). Árbol de mediano vigor y porte redondeado. Variedad muy productiva	
fruto	Fruto de forma piriforme, de tamaño medio y pulpa de color rojo granate. Muy apreciada por su consumo en fresco de sabor dulce y aromático. La piel es gruesa de color amarillo con rayas verdes longitudinales que la hacen especialmente atractiva y llamativa. La cosecha se puede alargar des de finales de setiembre hasta el mes de octubre.	
sinónimos	Coll de dama rimada, coll de dama pintada	


LUNGHET

descripción	Antigua variedad de la provincia de Como. Producción abundante de brevas en julio y de higos a finales de agosto.	
fruto	De calibre pequeño, alargado sobre todo los higos flores, dulce, los higos muy melosos. Variedad que se presta también para secar .	

SAJOLA

descripción	Variedad encontrada en las comarcas del Bages, Anoia, Llobregat.	
fruto	Fruto pequeño, blanco, que madura en agosto parece ser que se utilizaba también para secar.	

TRES FAN CARGA


descripción	Árbol vigoroso, puerto medio recto y poco ramificado. Producción regular en el caso de las brevas y escasa para los higos.	
fruto	Breva interesante por el tamaño de la fruta y la resistencia a su manipulación. Color de la epidermis morado verdoso. Pulpa roja oscura con un sabor mejor en la segunda producción. Maduración de breva la segunda mitad de junio y de higo la primera de septiembre .	

<h1>AVELLANO</h1>		
<h2>NEGRET DE REUS</h2>		
descripción	Arbusto con poca altura y muy rústico, es una de las variedades más extendidas en España.	
fruto	Fruto de calibre medio, de forma redonda un poco alargada. Carne blanca de buena calidad, también utilizada en la industria. Caída de los frutos durante la primera quincena de septiembre .	
<h1>CASTAÑERA</h1>		
descripción	Variedad antigua que se cultiva en toda la provincia de Tarragona. Árbol de porte semi-erecto de fuerte vigor.	
fruto	Fruto de forma globular, avellana de mesa de buena calidad y productiva. Época de cosecha a principio de septiembre	
<h1>PAUETET</h1>		
descripción	Arbusto con porte erecto, muy vigoroso, típico de zonas de regadío. Se considera un buen polinizador por la variedad Negret y con una entrada en producción precoz. Variedad muy productiva y con buenas características vegetativas.	
fruto	Fruto de calibre medio, de forma ovalada comprimida, variedad valorada para la industria como la Negret por la calidad de su carne. Caída de los frutos entre finales de agosto y principios de septiembre .	


<h1>CAQUI</h1>		
<h2>TOMATERO</h2>		
descripción	Variedad muy común en la zona de Segorbe (Valencia). Variedad local del grupo CFA (Constante en la Fecundación Astringente). Árbol de porte abierto, vigoroso y muy productivo.	
fruto	Fruto entre pequeño y mediano, redondo ligeramente achatado, de color anaranjado hasta llegar a rojo anaranjado en plena maduración. Pulpa muy azucarada y jugosa. Astringente. Su maduración se produce a finales de septiembre , aproximadamente unos quince días antes de Rojo brillante.	
<h2>TIPUS</h2>		
descripción	Variedad que pertenece al grupo PVNA (Pollination Variant Non Astringent). Árbol de vigor medio-elevado.	
fruto	Fruto de tamaño grande (peso medio 300 g), forma redonda, la piel es naranja con moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. La pulpa es naranja amarillenta de óptimo sabor. Maduración intermedia: desde la segunda década de Octubre hasta la segunda de Noviembre .	
<h1>GRANADOS</h1>		
<h2>GRANADO VINOSO</h2>		
descripción	Árbol de poco vigor, típico de las zonas mediterráneas. Se usa también como valla vegetal defensiva.	
fruto	Fruto grande, granas de color rojo vinoso, muy dulce y jugoso. Madura en octubre .	
<h2>MOLLAR DE ELCHE</h2>		
descripción	Árbol de poco vigor, típico de las zonas mediterráneas. Se usa también como valla vegetal defensiva.	
fruto	Fruto grande, granas rojas, dulce, jugoso, de sabor agridulce. Madura en octubre .	

OTROS FRUTALES


AMELANCHIER CANADENSIS

descripción	Arbusto caducifolio originario de América del Norte que puede alcanzar los 5 m de altura. Resistente a plagas, muy ornamental en primavera cuando se produce su abundante floración y en otoño cuando sus hojas se vuelven rojizas.	
fruto	El fruto es una baya de 7 a 10 mm de diámetro, púrpura al madurar, comestible y dulce. Los frutos maduran en junio	
Sinónimos	Guillomo del Canadá, cornillo o carrasquilla	

AZUFAIFO


descripción	Árbol espinoso, de crecimiento lento, muy rústico.	
fruto	Fruto del tamaño de una nuez, dulce y rojizo. Maduración en el mes de septiembre.	

FRAMBUESA


descripción	La frambuesa europea es una planta arbustiva con rebrotes de ciclo bianual que surgen de las raíces. Los vástagos pueden alcanzar una altura de 1,5 / 2m.	
fruto	Fruto muy jugoso y dulce y si no está bien maduro tiene cierta acidez. Se pueden elaborar jarabes, mermeladas, jaleas, helados y sorbetes. Variedad con dos producciones anuales (bífera) la primera en junio / julio y la segunda en otoño.	

ARANDANO		
descripció	Arbusto muy rustico i resistente el frio. Requieren suelos ácidos, drenados y frescos. Se aconseja un acolchado permanente.	
fruto	El fruto es de color azul claro, grande de sabor excelente. Se puede consumir en fresco, como transformado en mermelada i repostería. Se recolecta en julio/principios de agosto .	
GROSELLA ROJA		
descripció	Arbusto que puede alcanzar 1-2m de alto y ancho. Variedad temprana y muy productiva. Se pueden elaborar mermeladas, jaleas, helados y sorbetes.	
fruto	El fruto es de color rojo y cuelga en racimos, de sabor dulce y ácido a la vez. Maduración hacia junio/julio .	
GROSELLA NEGRA		
descripció	Es un arbusto semierecto de 1-2 m de alto y ancho. El fruto es muy apreciado tanto en fresco como en zumos, mermeladas, pasteles y sorbetes.	
fruto	El fruto es muy apreciado tanto en fresco como en zumos, mermeladas, pasteles y sorbete. Maduración tardía hacia el mes de agosto .	
RIBES UVA ESPINA		
descripció	Arbusto de 1-2 m de altura densamente ramificado y cubierto de espinas.	
fruto	Los frutos son de sabor dulce-ácido. Maduración el mes de julio .	


ZARZAMORA SIN ESPINAS

descripción	Arbusto perenne con tallos arqueados y sin espinas.	
fruto	Frutos negros y jugosos al madurar. Las zarzamoras son ricas en vitaminas, antioxidantes y fibra. Se utilizan en la cocina para hacer mermeladas, postres y zumos. Cosecha entre verano y otoño según la variedad.	

MADROÑO


descripción	Arbusto o árbol pequeño (entre 5 y 15 m de altura). Autóctono de los bosques mediterráneos.	
fruto	Los frutos son ricos en vitamina C. Para en consumo en fresco, elaboración de mermeladas y pasteles.	

MEMBRILLO “PERO COTOGNO


descripción	Árbol que necesita un clima cálido, pero resiste bien a las heladas. Árbol pequeño de forma arbustiva de vigor escaso. El uso habitual es hacer confitura o membrillo	
fruto	Los frutos son grandes y tienen forma de pera. La piel es de color amarillo-limón, con pelos grises y muy aromática. La carne es de sabor muy ácido, pero con la cocción se transforma en dulce y aromático. Se recoge al mes de octubre	

MORERA ALBA (fruto blanco)


descripción	Árboles de hasta 15 m de altura, se cultivaba tradicionalmente por sus hojas como alimento de los gusanos de seda.	
-------------	--	--

fruto	Fruto que se parece a una frambuesa o una mora, pero es más grande y alargada con una longitud de 1 a 3 cm. Las bayas son dulces de color blanco amarillento o rosado-violeta.	
-------	--	---


MORERA ALBA (fruto negro)

descripción	Árboles de hasta 15 m de altura, se cultivaba tradicionalmente por sus hojas como alimento de los gusanos de seda.	
fruto	Fruto que se parece a una frambuesa o una mora, pero es más grande y alargada con una longitud de 1 a 3 cm. Las bayas son muy dulces de color rojo-morado cuando maduran.	

NÍSPERO

fruto	Fruto marrón que se tiene que dejar madurar en la paja para que sea muy dulce y la pulpa se reblandezca y coja un color amarillo-naranja. Se recoge hacia septiembre-octubre y se deja incubar hasta que se aje un poco.	
-------	---	---

SAÚCO

descripción	Arbusto caducifolio del género <i>Sambucus</i> . Este arbusto lo encontramos básicamente en el entorno europeo, especialmente en las conchas del Mediterráneo.	
fruto	El fruto es una drupa redonda de color negro-violeta, carnoso y el glabre de unos 6-8 mm de diámetro. Es un fruto comestible cuando está muy maduro, pero en caso contrario puede tener efectos tóxicos. Para la elaboración de mermeladas, infusiones, zumos.	

<h1>SERBAL</h1>		
descripció	<p>Árbol rústico de lento crecimiento que sin embargo puede llegar a los 15 m de altura. Floración tardía hacia el mes de mayo.</p>	
fruto	<p>Fruto globoso con forma de manzana y pera, de 2-3 cm de tamaño, de color amarillento. Los frutos se recogen en otoño y, como el níspero, deben guardarse con paja para que acaben de madurar y se vuelvan muy dulces.</p>	
<h1>ENDRINO</h1>		
descripció	<p>El endrino (<i>Prunus spinosa</i>) es un arbusto de entre 1 y 2 metros de altura, caducifolio, de la familia de las Rosáceas. El endrino forma setos en los márgenes de los campos y en los bordes de los bosques, se caracteriza por una forma densamente enramada y con espinas en sus ramas.</p>	
fruto	<p>El fruto es una baya redondeada, de color azul – violeta y se va oscureciendo a medida que madura. Su sabor es áspero y astringente. Se cosecha a finales de verano y principios de otoño.</p>	
USOS	<p>Se ha utilizado, desde la antigüedad, como planta medicinal y alimenticia. Las endrinas se utilizan, sobre todo en Navarra, para la elaboración del licor pacharán, así como en la elaboración de salsas, mermeladas, jaleas... Su madera se utiliza en tornería y para fabricar bastones.</p>	

UVA

12 CAMPANADAS

descripción

Parra muy vigorosa y productiva, encontrada en las comarcas de Lleida (Pobla de Segur). Gracias a su piel gruesa, tradicionalmente se colgaba durante los meses de invierno y se comía la Nochevieja por las 12 campanadas.

fruto

Fruto redondo de tamaño medio con piel gruesa, de sabor dulce y se guarda durante meses en lugar fresco.

sinónimos

La Fontella de invierno.



CARDINAL

descripción

La cardinal es una uva de mesa tinta producida por primera vez en California en 1939. Muy resistente al transporte

fruto

Bayas de tamaño muy grande, de forma esférica con hollejo rojo a violeta oscuro. Maduración **principios de septiembre**.

consejos

Se utiliza como típica uva de mesa para comer y hacer pansas.



FRESA

descripción

Cepa americana, quizás el más antiguo introducido en Europa después de la filoxera. Se encuentran citas en Francia de 1820 y en Italia del 1825. Utilizado para vinificación, da un vino muy dulce y con características aromáticas que recuerdan la fresa. De hecho en Italia se elabora el vino "fragolino".

fruto

Uva de tamaño medio con piel gruesa y de color negro. Su consumo en fresco es muy apreciado por su sabor inesperado a fresa. Maduración a principios de septiembre.

sinónimos

Uva americana



MOSCATEL

descripción

Variedad probablemente originaria del pueblo de Alejandría de Egipto desde donde se habrían extendido en toda el área Mediterránea.

fruto

Fruto de tamaño medio y pequeño, con piel delgada de color blanco amarillento y sabor típico a moscatel. Muy buena uva de mesa, también se puede utilizar para hacer pasas y para elaborar el típico vino Moscatel. Cosecha de **mitad hasta finales de septiembre**.



PICAPOLL

descripción

Picapoll es una variedad autóctona de Cataluña y cultivada en la Denominación del Pla de Bages. Es una variedad de uva que podemos encontrar también en las regiones francesas del valle del Ródano y Languedoc, así como en España e Italia. Los vinos monovarietales de uva Picapoll Blanco de Pla de Bages, son vinos ligeros, con aromas afrutados y florales.

fruto

Los granos son elípticos, de calibre entre medio y pequeño, de color amarillo-verdoso. Maduración tardía.

consejos

Gracias a su piel gruesa, era una uva que se colgaba durante el invierno y se podía ir comiendo de ella sin que le atacaran los hongos. Los agricultores antiguamente la conservaban también para pasas.

sinónimos

También conocida como picapolla, piquepoul.



Queremos dar las gracias a
todas las personas aficionadas y apasionadas,
productores de fruta ecológica,
centros educativos,
paisajistas,
coleccionistas,
jardineros,
ayuntamientos,
parques,
ecologistas,
etc.
que creen en nuestro proyecto y que ayudan a
mantener viva la biodiversidad cultivada



www.arboreco.net

@arborecoviver

NOTA: Algunas de las imágenes y parte del texto del catálogo son los siguientes autores: Guillem Arribas "Variedades viejas de frutales" (Parque natural de la zona de la Garrotxa), Mariagrazia Tibiletti Bruno "I frutti Antichi", Josep Garcia (IRTA), Xavi Perez (Parque Agrario del Baix Llobregat), Morella (Ortells), Eric Dumont (Francia), Catálogo "Vivai Battistini", Bonometti Emanuela, Catálogo "Rocalba", Floracatalana.net.

EL CATÁLOGO ESTÁ SIEMPRE EN EVOLUCIÓN SI NOS QUIEREN HACER LLEGAR IMÁGENES O DESCRIPCIONES DE LAS VARIETADES, EL IREMOS ACTUALIZANDO. MUCHAS GRACIAS.



info@arboreco.net · tel. 650742502 · @arborecoviver - Cruilles, Baix Empordà



ES-ECO-019-CT
Agricultura UE

